

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS**GAVISCON BABY suspensie voor oraal gebruik**

natriumalginaat en natriumbicarbonaat

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt de klacht van uw kind na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt uw kind veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt het een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt Gaviscon Baby gebruikt?
2. Wanneer mag u Gaviscon Baby niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Gaviscon Baby?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Gaviscon Baby?
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT GAVISCON BABY GEBRUIKT?

Gaviscon Baby wordt gebruikt om de symptomen van zure oprispingen (reflux) te behandelen.

2. WANNEER MAG U GAVISCON BABY NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**Wanneer mag u Gaviscon Baby niet toedienen aan uw kind?**

- Als het allergisch (overgevoelig) is voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Gaviscon Baby?

- als uw kind een zeer zoutarm dieet moet volgen,
- als het te veel calcium in het bloed heeft,
- als het nierstenen heeft.

Het is belangrijk om de aanbevolen dosis te respecteren omdat Gaviscon Baby veel natrium bevat.

Als uw kind al andere geneesmiddelen inneemt, moet u ook de rubriek "**Gebruikt uw kind nog andere geneesmiddelen?**" lezen.

Raadpleeg uw arts als een van de bovenstaande waarschuwingen voor uw kind van toepassing is, of dat in het verleden geweest is.

Gebruikt uw kind nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt uw kind naast Gaviscon Baby nog andere geneesmiddelen, of heeft het dat kort geleden gedaan? Vertel het dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Er zijn geen geneesmiddeleninteracties bekend met Gaviscon. Zuurremmers (antacida) kunnen de resorptie wijzigen van geneesmiddelen zoals digoxine (middel gebruikt bij hartfalen en hartritmestoonissen), tetracyclines (een soort antibiotica), H₂-antihistaminica (zuurremmers).

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Gaviscon mag tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding worden gebruikt, behalve wanneer zoutbeperking nodig is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Stoffen in Gaviscon Baby waarmee u rekening moet houden

Elke dosis van 10 ml bevat 145 mg natrium. Als uw kind een strikt zoutarm dieet moet volgen, zoals bij sommige nier- of hart- en bloedvataandoeningen, moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van natrium.

Gaviscon bevat methylparahydroxibenzoaat (E218) en propylparahydroxibenzoaat (E216). Deze bewaarmiddelen kunnen allergische reacties veroorzaken (soms pas laatijdig).

3. HOE GEBRUIKT U GAVISCON BABY?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gaviscon Baby is beschikbaar in een fles met doseerspuit voor orale toediening met verdelingen in ml: de dosis bedraagt 1 à 2 ml/kg/dag, te verdelen volgens het aantal maaltijden en toedienen na elke fles of maaltijd.

De gebruikelijke dosering is:

- van 0 tot 1 maand: 1 ml na elke maaltijd (6 keer per dag)
- van 1 tot 2 maanden: 1,5 ml na elke maaltijd (5 keer per dag)
- van 2 tot 4 maanden: 2 ml na elke maaltijd (5 keer per dag)
- van 4 tot 18 maanden: 2,5 ml na elke maaltijd (4 keer per dag)
- vanaf 18 maanden: 5 ml na elke maaltijd (4 keer per dag)

De dosis Gaviscon Baby moet ná de maaltijd worden ingenomen en mag niet worden gemengd met melk of voeding.

De behandeling zal worden voortgezet totdat de symptomen zijn verdwenen.

Samen met het gebruik van Gaviscon Baby zijn volgende voedingstips aangewezen bij reflux:

- verdik voldoende de voeding,
- dien de maaltijden in kleine porties toe.

Raadpleeg een arts als de symptomen verergeren of langer aanhouden dan 7 dagen.

Wijze van toediening

Goed schudden vóór gebruik.

- Zuig met de doseerspuit voor orale toediening de nodige hoeveelheid suspensie op uit de fles.
- Dien de suspensie met behulp van de doseerspuit voor orale toediening toe aan het kind.
- Na gebruik de doseerspuit voor orale toediening grondig spoelen en drogen.

Heeft uw kind te veel van Gaviscon Baby ingenomen?

Het is weinig waarschijnlijk dat uw kind iets zal voelen als het een te hoge dosis heeft ingenomen. Raadpleeg uw arts of uw apotheker als u de indruk heeft dat uw kind zich opgeblazen voelt.

Als uw kind te veel Gaviscon heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten Gaviscon Baby toe te dienen aan uw kind?

Als u vergeten bent een dosis van het geneesmiddel toe te dienen aan uw kind, dien deze dan toe zodra u het zich herinnert. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, wacht u tot dan om het geneesmiddel toe te dienen en slaat u de vergeten dosis over.

Dien geen dubbele dosis toe om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het toedienen van Gaviscon Baby

De behandeling mag worden stopgezet zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Gaviscon Baby bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

In zeer zeldzame gevallen, als uw kind gevoelig is voor bepaalde bestanddelen, kan het allergische verschijnselen vertonen zoals huiduitslag of ademhalingsproblemen.

Krijgt uw kind veel last van een bijwerking? Of heeft het een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U GAVISCON BABY?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast bewaren. De fles na gebruik zorgvuldig sluiten. Gebruik binnen 30 dagen na openen.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Gaviscon Baby?

- De werkzame stoffen in dit middel zijn: 500 mg natriumalginaat en 267 mg natriumbicarbonaat (per 10 ml).
- De andere stoffen in dit middel zijn: calciumcarbonaat, carbomeer, natriumhydroxide, natriumsaccharinaat, venkelaroma, banaanaroma, methylparahydroxibenzoaat (E218), propylparahydroxibenzoaat (E216), gezuiverd water.

Hoe ziet Gaviscon Baby er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Gaviscon Baby is een crèmekleurige suspensie met een karakteristieke bananengeur. Het is beschikbaar in verpakkingen met 150 ml of 300 ml suspensie. Elke verpakking bevat een doseerspuit voor orale toediening van 6 ml (met 0,5 ml maatstrepen).

Afleveringswijze: vrije aflevering.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:

BE386802.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA

Researchdreef 20, BE-1070 Brussel

Fabrikant
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane, Hull
HU8 7DS East Yorkshire, Verenigd Koninkrijk

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 06/2012.