

Sekretionen notwendig ist, nicht angewendet werden.

Kinder

Dieses Arzneimittel ist auch für Kinder angezeigt.

Anwendung von DROSETUX zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Anwendung von DROSETUX zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Die Einnahme soll über den Tag verteilt werden, vorzugsweise außerhalb der Mahlzeiten und beim Zubettgehen.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

DROSETUX hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

DROSETUX enthält Saccharose

Bitte nehmen Sie erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

100 g enthalten 64,14 g Saccharose.
1 Dosis von 2,5 ml = 2,1 g Saccharose / 1 Dosis von 5 ml = 4,2 g Saccharose / 1 Dosis von 15 ml = 12,6 g Saccharose.

DROSETUX enthält Saccharose: bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrem Speiseplan, wenn Sie eine zuckerreduzierte Diät befolgen oder Diabetiker sind.

3. Wie ist DROSETUX anzuwenden?

Dosierung

Erwachsene: 1 Dosis von 15 ml mithilfe des Dosierbechers, 2- bis 3mal täglich.

Kinder ab 5 Jahren: 1 Dosis von 5 ml mithilfe des Dosierbechers, 3- bis 5mal täglich.

Kinder unter 5 Jahren: 1 Dosis von 2,5 ml mithilfe des Dosierbechers, 3- bis 4mal täglich.
Für Kinder unter 2 Jahren ist die Selbstmedikation abgeraten, den Arzt soll man um Rat fragen.

Die Einnahme soll über den Tag verteilt werden, vorzugsweise außerhalb der Mahlzeiten und beim Zubettgehen.

Wenn sich die Symptome verschlimmern oder länger als 3 Tagen anhalten, soll einen Arzt aufgesucht werden.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen.

Benutzen Sie den in der Verpackung gelieferten Dosierbecher um den Sirup zu verabreichen. Die Menge eist in ml auf dem Dosierbecher angebegeben.

Wenn Sie eine größere Menge von DROSETUX angewendet haben, als Sie sollten

Entsprechend den Grundsätzen der Homöopathie bezieht sich die Wirkung auf den Verdünnungsschritt und nicht auf die Dosierung. Wenn Sie mehr als die empfohlene Dosis eingenommen haben wird die Wirkung deswegen nicht stärker.

Wenn Sie eine größere Menge von DROSETUX angewendet haben sind deshalb keine Nebenwirkungen zu erwarten.

Wenn Sie nachträglich Fragen haben, kontaktieren Sie Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antiflogizentrum (Tel. 070/245.245).

Wenn Sie die Anwendung von DROSETUX vergessen haben
Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das in aufgeführte nationale Meldesystem anzeigen:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

Abteilung Vigilanz

EUROSTATIÖN II - Victor Hortaplein, 40/40 - B-1060 Brüssel

Website: www.fagg-afmps.be

E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist DROSETUX aufzubewahren?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Außere Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was DROSETUX enthält

Die Wirkstoffe sind:

Amica montana 4 CH 0,1 g	Drosera 4 CH 0,1 g
Belladonna 4 CH 0,1 g	Ferrum
Cina 4 CH 0,1 g	phosphoricum 5 CH 0,1 g
Coccus cacti 5 CH 0,1 g	Ipeca 4 CH 0,1 g
Corallium rubrum 4 CH 0,1 g	Solidago
Cuprum	virga aurea 3 DH 0,1 g
metallicum 5 CH 0,1 g	Für 100 g.

- Die sonstigen Bestandteile sind: Natriumbenzoat, Citronensäure-Monohydrat, gereinigtes Wasser, Saccharose Lösung.

Wie DROSETUX aussieht und Inhalt der Packung

DROSETUX ist ein in einer 150 ml Flasche und einer Schachtel verpackter Sirup, mit einem graduiertem Dosierbecher.

Inhaber und Hersteller

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - Frankreich

Notifizierungsnummer 341 CH 740 F8

Art der Abgabe

Apothekenpflichtig

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 10/2013.

NOTICE INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Drosetux®

Sirop

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DROSETUX et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DROSETUX ?
3. Comment utiliser DROSETUX ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DROSETUX ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que DROSETUX et dans quel cas est-il utilisé ?

Médicament homéopathique contenant des composants traditionnellement utilisés dans le traitement des toux sèches, d'irritation et dans les toux non productives gênantes.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DROSETUX ?

N'utilisez jamais DROSETUX :

- si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à une plante de la famille des Astéracées (Composées).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser DROSETUX si vous posez des questions par rapport à l'utilisation de ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrose/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de toux productives (toux grasses) qui doivent être respectées car nécessaires à l'évacuation des sécrétions bronchiques.

Enfants

Ce médicament est aussi indiqué chez les enfants.

Autres médicaments et DROSETUX

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

DROSETUX avec des aliments et boissons et de l'alcool

Les prises doivent être réparties au cours de la journée, de

préférence en dehors des repas, et au coucher.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

DROSETUX n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

DROSETUX contient du saccharose

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

100 g contiennent 64,14 g de saccharose.

1 dose de 2,5 ml = 2,1 g de saccharose / 1 dose de 5 ml = 4,2 g de saccharose / 1 dose de 15 ml = 12,6 g de saccharose.

Ceci doit être pris en compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou en cas de diabète.

3. Comment utiliser DROSETUX ?

Posologie

Adultes : 1 dose de 15 ml à l'aide du godet-doseur, 2 à 3 fois par jour.

Enfants à partir de 5 ans : 1 dose de 5 ml à l'aide du godet-doseur, 3 à 5 fois par jour.

Enfants de moins de 5 ans : 1 dose de 2,5 ml à l'aide du godet-doseur, 3 à 4 fois par jour.

Pour les enfants de moins de 2 ans, l'automédication est déconseillée dans le traitement de la toux, un médecin doit être consulté.

Les prises doivent être réparties au cours de la journée, de préférence en dehors des repas, et au coucher.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 3 jours, un médecin doit être consulté.

Mode d'administration

Voie orale.

Utiliser le godet-doseur fourni dans l'emballage pour administrer le sirop. La quantité en ml est indiquée sur le godet-doseur.

Si vous avez utilisé plus de DROSETUX que vous n'auriez dû

Selon le principe de l'homéopathie, l'effet du médicament homéopathique est lié au degré de dilution des substances actives et non à la dose ingérée. Dans le cas où une double dose serait prise, l'effet ne sera alors pas plus prononcé.

Quand vous utilisez plus de DROSETUX que vous n'auriez dû, des effets secondaires ne sont, par conséquent, pas attendus.

Si vous avez encore des questions, contactez votre médecin, pharmacien ou le Centre Antipoisons (tél. 070/245.245).

Si vous oubliez d'utiliser DROSETUX

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Dans des cas individuels des réactions d'hypersensibilité peuvent survenir.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
EuroStation Vigilance
EUROSTATION II - Place Victor Horta, 40/ 40 - B-1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir
davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver DROSETUX ?

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient DROSETUX

- Les substances actives sont :

Amica montana 4 CH 0,1 g	Drosera 4 CH 0,1 g
Belladonna 4 CH 0,1 g	Ferrum
Cina 4 CH 0,1 g	phosphoricum 5 CH 0,1 g
Coccus cacti 5 CH 0,1 g	Ipeca 4 CH 0,1 g
Corallium rubrum 4 CH 0,1 g	Solidago
Cuprum	virga aurea 3 DH 0,1 g
metallicum 5 CH 0,1 g	Pour 100 g.

- Les autres composants sont : Benzoate de sodium, Acide citrique monohydraté, Eau purifiée, Solution de saccharose.

Aspect de DROSETUX et contenu de l'emballage extérieur
DROSETUX se présente sous forme de sirop. Il est conditionné dans une boîte contenant un flacon de 150 ml avec un godet-doseur gradué.

Titulaire et fabricant

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - France

Numéro de notification 341 CH 740 F8

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 10/2013.

BIJSLUITER
INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Drosetux
Sirop

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.

- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is DROSETUX en waarvoor wordt het gebruikt?

2. Wanneer mag u DROSETUX niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3. Hoe gebruikt u DROSETUX?

4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u DROSETUX?

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is DROSETUX en waarvoor wordt het gebruikt?

Homeopathisch geneesmiddel dat bestanddelen bevat die traditioneel gebruikt worden bij de behandeling van droge hoest, prikkelhoest en vervelende niet-productieve hoest.

2. Wanneer mag u DROSETUX niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u DROSETUX niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

- U bent allergisch voor planten van de Composietenfamilie (Asteraceae).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met DROSETUX?

Als u vragen heeft met betrekking tot het gebruik van dit geneesmiddel, neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen zoals fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptie of sucrose-isomaltase insufficiëntie wordt de inname van dit geneesmiddel niet aangeraden.

Dit geneesmiddel moet niet gebruikt worden bij productieve hoest (slijmhoest), die gerespecteerd moet worden om de bronchiale secreties op te hoesten.

Kinderen

Dit geneesmiddel is ook bestemd voor kinderen.

Gebruik u nog andere geneesmiddelen?

Informeer uw arts of apotheker wanneer u nog andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleefd heeft gebruikt of wanneer de mogelijkheid bestaat dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

De inname moeten over het verloop van de dag verdeeld worden, bij voorkeur buiten de maaltijden en voor het slapengaan.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

DROSETUX heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

DROSETUX bevat saccharose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

100 g bevat 64,14 g saccharose.

1 dosis van 2,5 ml = 2,1 g saccharose / 1 dosis van 5 ml = 4,2 g saccharose / 1 dosis van 15 ml = 12,6 g saccharose.

Maak de hoeveelheden dient rekening gehouden te worden bij een suikerarm dieet of bij diabetes.

3. Hoe gebruikt u DROSETUX?

Dosering

Volwassenen: 1 dosis van 15 ml met behulp van de doseerdop, 2 tot 3 maal per dag.

Kinderen vanaf 5 jaar: 1 dosis van 5 ml met behulp van de doseerdop, 3 tot 5 maal per dag.

Kinderen jonger dan 5 jaar: 1 dosis van 2,5 ml met behulp van de doseerdop, 3 tot 4 maal per dag.

Zelfmedicatie wordt bij kinderen jonger dan 2 jaar niet aangeraden, een arts moet geraadpleegd worden.

De inname moeten over het verloop van de dag verdeeld worden, bij voorkeur buiten de maaltijden en voor het slapengaan.

Als de symptomen na 3 dagen aanhouden of erger worden, moet een arts geraadpleegd worden.

Wijze van toediening

Oraal gebruik.

Gebruik de doseerdop meegeleverd in de verpakking om de sirop toe te dienen. De hoeveelheid in ml is op de doseerdop aangegeven.

Heeft u te veel DROSETUX gebruikt?

Volgens het homeopathisch principe is de werking gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van DROSETUX heeft gebruikt, zal het effect daardoor niet sterker zijn.

Wanneer u meer DROSETUX heeft gebruikt dan u zou mogen, zijn bijgevolg geen bijwerkingen te verwachten.

Wanneer u toch nog vragen heeft, neem contact op met uw arts, apotheker of het Anticijgenkantoor (tel. 070/245.245).

Bent u vergeten DROSETUX te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

In individuele gevallen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldstelsel.

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie

EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/40 - B-1060 Brussel

Website: www.fagg.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u DROSETUX?

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen bevat DROSETUX?

- De werkzame stoffen zijn:

Amica montana 4 CH 0,1 g	Drosera 4 CH 0,1 g
Belladonna 4 CH 0,1 g	Ferrum
Cina 4 CH 0,1 g	phosphoricum 5 CH 0,1 g
Coccus cacti 5 CH 0,1 g	Ipeca 4 CH 0,1 g
Corallium rubrum 4 CH 0,1 g	Solidago
Cuprum	virga aurea 3 DH 0,1 g
metallicum 5 CH 0,1 g	Voor 100 g.

- De andere stoffen zijn: Natriumbenzoaat, Citronzuur monohydraat, Gezuiverd water, Saccharose oplossing.

Hoe ziet DROSETUX eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
DROSETUX wordt verkocht in de vorm van sirop, verpakt in een doos met een fles van 150 ml en een gedoseerde doseerdop.

Houder en fabrikant

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - Frankrijk

Notificatienummer 341 CH 740 F8

Afleveringswijze

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 10/2013.

GEBRAUCHSINFORMATION
INFORMATIE FÜR ANWENDER

Drosetux
Sirop

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist DROSETUX und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von DROSETUX beachten?
3. Wie ist DROSETUX anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist DROSETUX aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist DROSETUX und wofür wird es angewendet?

Homöopathisches Arzneimittel dessen Bestandteile zur Behandlung vom trockenen Husten, Reizhusten oder unproduktiven peiniglichen Husten traditionell angewendet werden.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von DROSETUX beachten?

DROSETUX darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

- wenn Sie allergisch gegen eine Pflanze der Asteraceae (Compositae) Familie sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie DROSETUX anwenden, wenn Sie sich Frage über die Anwendung dieses Arzneimittels stellen.

Dieses Arzneimittel darf im Falle von produktivem Husten (Schleimhusten), der für die Absonderung bronchialer