

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Livostin 0,5 mg/ml oogdruppels, suspensie

levocabastine

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt Livostin gebruikt?
2. Wanneer mag u Livostin niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Livostin?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Livostin?
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT LIVOSTIN GEBRUIKT?

Livostin is een middel tegen allergische oogklachten.

Livostin oogdruppels zijn aangewezen voor een snelle en langdurige verlichting van ontsteking van de ogen door overgevoeligheid, zoals bij hooikoorts. Die kunnen zowel in bepaalde seizoenen als het hele jaar door optreden.

2. WANNEER MAG U LIVOSTIN NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**Wanneer mag u Livostin niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. Raadpleeg in geval van twijfel eerst uw arts of apotheker.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

- Livostin is enkel te gebruiken voor oogontstekingen door allergie (overgevoeligheid) en niet voor andere oogontstekingen of aandoeningen.

- Als u een nieraandoening heeft, mag u Livostin oogdruppels niet langdurig gebruiken, omdat het geneesmiddel vooral via de nieren wordt uitgescheiden.
- Draag geen zachte contactlenzen terwijl u Livostin oogdruppels in uw ogen aanbrengt.

Volgende maatregelen zijn, na toediening van de oogdruppel, nuttig om opname in de bloedsomloop te verminderen:

- het ooglid gedurende 2 minuten gesloten houden;
- het traankanaal met de vinger toedrukken gedurende 2 minuten.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn nog onvoldoende gegevens bekend over de mogelijke wisselwerkingen met andere geneesmiddelen die u in de ogen moet aanbrengen. U kunt dit geneesmiddel dus beter niet samen met dergelijke middelen gebruiken.

Gebruikt u naast Livostin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Geen bijzonderheden.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Over de invloed van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap bij de mens zijn nog geen gegevens bekend. Uw arts of apotheker zal uitmaken of u de oogdruppels mag gebruiken tijdens uw zwangerschap.

U mag de oogdruppels niet gebruiken in de periode waarin u borstvoeding geeft zonder dit eerst met uw arts te bespreken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Livostin oogdruppels veroorzaken geen slaperigheid en verminderen het reactievermogen en de reactiesnelheid niet. De oogdruppels kunnen worden gebruikt door bestuurders van voertuigen of door personen die machines bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Livostin oogdruppels bevatten benzalkoniumchloride en propyleenglycol. Voorkom contact met zachte contactlenzen aangezien dit oogirritatie kan veroorzaken. Contactlenzen voor het toedienen van de oogdruppels verwijderen en ten minste 15 minuten wachten voor het terugplaatsen. Kan zachte contactlenzen doen verkleuren.

3. HOE GEBRUIKT U LIVOSTIN?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen:

De gebruikelijke dosering is 1 druppel Livostin per oog, 2 maal per dag.

Als de klachten ernstig zijn, kunt u 3 tot 4 maal per dag 1 druppel per oog toedienen.

Keer het flesje om en druppel telkens 1 oogdruppel rechtstreeks in de buitenste ooghoek.

Voor elk gebruik moet u het druppelflesje goed schudden.

U mag de oogdruppels niet langer gebruiken dan 1 maand na de eerste opening van het druppelflesje. Om hygiënische redenen moet u ieder contact van het flesje met de ogen vermijden.

Heeft u teveel Livostin gebruikt?

Als u in de ogen te veel Livostin-oogdruppels aanbrengt, treden geen vergiftigingsverschijnselen op.

Als u de inhoud van het flesje per ongeluk in de mond krijgt en inslikt, zou u zich slaperig kunnen voelen. In dat geval moet u veel niet-alcoholische dranken drinken, zodat het geneesmiddel sneller wordt uitgescheiden door de nieren.

Wanneer u teveel van Livostin heeft gebruikt of het product hebt ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070.245.245).

Bent u vergeten Livostin te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Livostin

Geen bijzonderheden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Livostin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende neveneffecten kunnen bij het gebruik van Livostin oogdruppels ernstig worden: zwelling van het oog, zwelling van het ooglid, bloedophoping in het oog, een speciale vorm van allergische reactie, gekenmerkt door een zwelling van de lippen, de tong en de oogleden, netelroos en ademtekort (angioneurotisch oedeem), en overgevoeligheid. Als u één van deze bijwerkingen ervaart is het aangeraden de behandeling te stoppen en uw arts of apotheker te raadplegen.

Bijwerkingen die vaak voorkomen (bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers) zijn:

- oogpijn
- troebel zicht

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers) zijn:

- hoofdpijn

Bijwerkingen waarvan de frequentie niet bekend is (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

- conjunctivitis, ontsteking van de oogleden, waterige ogen
- irritatie van de huid daar waar de huid in contact is gekomen met het geneesmiddel, netelroos
- reactie ter hoogte van de plaats van aanbrengen zoals branderigheid, roodheid, irritatie, pijn, zwelling, jeuk in de ogen en troebel zicht

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U LIVOSTIN?

Livostin oogdruppels dient bij kamertemperatuur (15-25°C) te worden bewaard. Sluit het druppelflesje na elk gebruik goed af om iedere besmetting te voorkomen.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Livostin niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na de letters EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Livostin?

- De werkzame stof in Livostin is levocabastinehydrochloride. Elke ml bevat 0,5 mg levocabastine. 1 ml oogdruppels komt overeen met 33 druppels, waarbij elke druppel 0,015 mg levocabastine bevat.

- De andere stoffen in Livostin zijn: 0.295mg/ml benzalkoniumchloride 50%ige oplossing als bewaarmiddel, propyleenglycol, polysorbaat 80, dinatrium monowaterstoffosfaat watervrij, natrium diwaterstoffosfaat monohydraat, dinatriumedetaat, hypromellose 2910 3000mPa.s, water voor injecties.

Hoe ziet Livostin eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Druppelflesje met 4 ml oogdruppels, suspensie.

Afleveringswijze

België: Livostin oogdruppels zijn niet op medisch voorschrift.

Luxemburg: Livostin oogdruppels zijn op medisch voorschrift.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Johnson & Johnson Consumer NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Fabrikant

Famar S.A

Agiou Dimitriou 63

Alimos Attiki

17456

Griekenland

En

Johnson & Johnson Consumer NV/SA

Antwerpseweg 15-17

B- 2340 Beerse

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

BE 154533

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 05/2016

