

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

GASTRICALM®, kauwtabletten

Magaldraat 400 mg

Lees de hele bijsluiter goed door voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na vier à vijf dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Gastricalm® en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u Gastricalm® niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Gastricalm®?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Gastricalm®?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

1. WAT IS GASTRICALM® EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Gastricalm® is een geneesmiddel in tabletvorm tegen maagzweer en maagzuurproblemen, en wordt gebruikt bij:

- acute of chronische ontsteking van het maagslijmvlies;
- verhoging van maagzuur;
- terugvloeiing van maag- of slokdarmvloeistof;
- maagbranderigheid tijdens zwangerschap;
- maagzweer of zweer in dunne darm;
- occasionele maagklachten bij gebruik van bepaalde geneesmiddelen.

Gastricalm® vormt een film in de maag die beschermt tegen maagzuur.

2. WANNEER MAG U GASTRICALM® NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Gastricalm® niet gebruiken?

Neem Gastricalm® niet in als u een ernstige nierbeschadiging heeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Gastricalm®?

Gelijktijdige inname van alcohol, koffie en citroenzuur bevattende dranken, zoals fruitsap moet worden vermeden.

Patiënten met nierinsufficiëntie moeten hun dokter raadplegen bij langdurig gebruik van Gastricalm®. Hetzelfde geldt voor patiënten met een fosfaatarm dieet.

Indien u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Omwille van mogelijke wisselwerkingen, is het aangeraden het gelijktijdig gebruik van Gastricalm® te vermijden met andere geneesmiddelen. Hiervoor kunt U steeds uw dokter of apotheker raadplegen. In 't algemeen, is het aangeraden de andere geneesmiddelen met een tussenpauze van 1 tot 2 uur in te nemen voor of na de inname van Gastricalm®.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Gelijktijdige inname van alcohol, koffie en citroenzuur bevattende dranken, zoals fruitsap moet worden vermeden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Zwangerschap:

- Hoge dosissen van Gastricalm® mogen niet worden ingenomen tijdens de zwangerschap
- Bovendien mag Gastricalm® niet langer worden ingenomen dan twee weken tijdens de zwangerschap.
- Raadpleeg een arts voor elke herhaalde inname van Gastricalm® langer dan twee weken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding:

- Aluminiumverbindingen komen terecht in de moedermelk.
- Hoge dosissen van Gastricalm® mogen niet worden ingenomen tijdens de borstvoeding.
- Bovendien mag Gastricalm® niet langer worden ingenomen dan twee weken tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

De inname van Gastricalm® oefent geen enkele nadelige invloed uit op het besturen van voertuigen en het gebruik van machines.

3. HOE GEBRUIKT U GASTRICALM®?

Gebruik Gastricalm® altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem 1 tot 2 tabletten, indien nodig, meermaals per dag. Kauwen, opzuigen of knabbelen 1 tot 3 uur na de maaltijd en op het ogenblik van pijn toestanden.

In geval van maagzweer of zweer in dunne darm, gelieve 5 tot 6 tabletten te nemen; 1 tot 3 uur na de maaltijd en voor het slapen gaan.

Niet meer dan 20 tabletten per dag gebruiken en deze maximale hoeveelheid niet langer dan 2 weken gebruiken zonder medisch toezicht.

Raadpleeg uw arts als de spijsverteringsproblemen langer duren dan 14 dagen.

Heeft u te veel van Gastricalm® ingenomen?

Wanneer u teveel van Gastricalm® tabletten heeft gebruikt of ingenomen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten Gastricalm® in te nemen?

Niet van toepassing.

Als u stopt met het gebruik van Gastricalm®

Alleen te gebruiken bij klachten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook Gastricalm® bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bij langdurig gebruik kan verstopping optreden.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U GASTRICALM®?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15°C - 25°C) en buiten invloed van vocht (op een droge plaats).

Gebruik Gastricalm® niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EX. Daar staat een maand en een jaar. De eerste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen bevat Gastricalm®?

- De werkzame stof in Gastricalm® is : Magaldrat 400 mg (=aluminium magnesium hydroxide sulfaat)
- De andere stoffen in Gastricalm® zijn : lac sine flore lactis - saccharose - mannitol - vanille aroma – magnesiumstearaat.

Hoe ziet Gastricalm® er uit en hoeveel tabletten zitten er in een verpakking?

De tabletten zijn wit en rond; voor oraal gebruik. Een doosje (20 tabletten) bevat 2 blisterverpakkingen à 10 tabletten of 5 blisterverpakkingen à 10 tabletten (50 tabletten) of 10 blisterverpakkingen à 10 tabletten (100 tabletten). Niet alle verpakkingen hoeven in de handel te zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Novum Pharma B.V.
Keysersweg 20
2201 CW Noordwijk
The Netherlands.

Fabrikant:

Sanico NV
Industriezone 4
Veedijk 59
B-2300 Turnhout

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 09/2016.