

BIJSLUITER
Panacur Tabletten 500 mg

**1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**

Registratiehouder:

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Nederland
Vertegenwoordigd door MSD Animal Health BVBA, Lynx Binnenhof, 5, 1200 Brussel

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet GesmbH, Siemensstraße 105, A-1210 Wenen, Oostenrijk

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Panacur Tabletten 500 mg

3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDD(E)L(EN)

Actief bestanddeel:

fenbendazole

500mg/tablet.

4. INDICATIE(S)

Besmetting van middelgrote en grote honden door gastro-intestinale nematoden en cestoden zoals:

Toxocara canis

Toxascaris leonina

Ancylostoma caninum

Uncinaria stenocephala

Trichuris vulpis

Taenia spp. o.a. *T. hydatigena*, *T. pisiformis*

Toxocara cati

Ancylostoma tubaeforme

Taenia taeniaformis

Aelurostrongylus

Ollulanus

5. CONTRA-INDICATIE(S)

Geen.

6. BIJWERKINGEN

In zeldzame gevallen kunnen maag-darmstelselaandoeningen (zoals braken en milde diarree) waargenomen worden bij honden.

In zeer zeldzame gevallen kunnen allergische reacties waargenomen worden bij honden.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Voor middelgrote en grote honden (meer dan 15 kg).

Voor jonge en kleine honden worden Panacur Tabletten 250 mg toegediend.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Orale toediening.

De dosering per dag bedraagt 50 mg fenbendazole per kg lichaamsgewicht.

De dieren moeten behandeld worden gedurende 3 opeenvolgende dagen.

Lichaamsgewicht (kg)	Aantal tabletten per dag
15	1 ½
20	2
25	2 ½
30	3
enz.	enz.

In geval van een nieuwe besmetting dient de behandeling herhaald te worden.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

- Ofwel direct in de muil door de tablet op de basis van de tong te leggen
- ofwel verbrijzelen en mengen met het voedsel
- ofwel oplossen in een beetje water en mengen met het voedsel.

10. WACHTTERMIJN

Niet van toepassing.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren onder 25°C

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de verpakking na “EXP.:”. De houdbaarheidsdatum overeenkomt met de laatste dag van de vermelde maand.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient:

Was de handen na gebruik.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg:

I.v.m. mogelijke embryotoxische effecten dient bij het begin van de dracht terughoudendheid te worden betracht.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

De toediening van Panacur is compatibel met gelijktijdige vaccinaties en andere behandelingen, zoals met antibiotica.

**13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Augustus 2016

15. OVERIGE INFORMATIE

Doos met 10 tabletten in blisterverpakking.

Registratienummer : BE-V176784

Afleveringswijze : vrije aflevering