

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

ECHINACIN LIQUIDUM drinkbare oplossing

Echinacea purpurea (L) Moench

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- U moet contact opnemen met uw arts indien uw klacht na 14 dagen niet vermindert, of zelfs erger wordt.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Echinacin Liquidum en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wanneer mag u Echinacin Liquidum niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Echinacin Liquidum in
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Echinacin Liquidum
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS ECHINACIN LIQUIDUM EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Echinacin Liquidum wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van bovenste luchtwegeninfecties, na uitsluiting van elke ernstige aandoening.

2. WANNEER MAG U ECHINACIN LIQUIDUM NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- als u allergisch (overgevoelig) bent aan Echinacea purpurea of aan één van de andere bestanddelen van Echinacin Liquidum.
- als u een evoluerende aandoening heeft zoals tuberculose, abnormale verhoging van het aantal witte bloedcellen, aandoeningen van het bindweefsel, multiple sclerose, AIDS en aanverwante infecties en auto-immuunziekten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of uw apotheker vóór Echinacin Liquidum in te nemen.

- Indien U reeds andere geneesmiddelen inneemt, lees dan aandachtig de rubriek Gebruikt u nog andere geneesmiddelen??"
- Geen langdurig gebruik zonder medisch advies.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Echinacin Liquidum nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Bijsluiter

Door gebrek aan informatie betreffende een eventuele interactie met een desensibilisatiekuur tegen allergie, is toediening van Echinacin Liquidum tijdens dergelijke kuur niet aangeraden.

Aangezien het hier gaat om een preparaat dat alcohol bevat, kan een Disulfiram effect optreden na associatie met andere geneesmiddelen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Alcoholisme vormt een relatieve contra-indicatie.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Aangezien er geen experimentele studies gekend zijn, is het aangeraden om dit geneesmiddel niet te gebruiken tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Indien men zich aan de voorgeschreven dosis houdt, zal de geabsorbeerde hoeveelheid alcohol normaal geen enkele invloed hebben op het besturen van voertuigen en het gebruik van machines.

Men moet rekening houden dat dit flesje een hoeveelheid alcohol bevat dat een negatieve invloed kan hebben bij het besturen van voertuigen en het gebruik van machines, indien de inhoud van het flesje in één keer uitgedronken wordt.

Echinacin Liquidum bevat 22 % ethanol (alcohol), d.w.z. max 440 mg per dosis, hetgeen overeenkomt met 11 ml bier, 4,6 ml wijn per dosis.

Schadelijk bij alcoholisme.

Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

3. HOE NEEMT U ECHINACIN LIQUIDUM IN

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Indien geen enkele verbetering optreedt, gelieve dan opnieuw uw arts te raadplegen.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen :

- De eerste dag : de eerste dosis is 2,5 ml. Vervolgens en voor de rest van de dag is de dosis 1,25 ml elke 2 uur.
- Vanaf de tweede dag is de dosis 3 x 2,5 ml per dag.

De maximale dosis is 15 ml per dag.

Gebruik bij kinderen

Kinderen tussen 2 en 12 jaar:

1 druppel per kilogram lichaamsgewicht van het kind per dag, in 3 innames per dag

Kinderen onder de 2 jaar:

Enkel op medisch advies.

Echinacin Liquidum dient verdund te worden in een beetje vloeistof.

Bijsluiter

Een behandeling op lange termijn brengt geen bijkomende voordelen mee. De maximale duur van een ononderbroken behandeling is twee weken.

Uw huisarts zal u zeggen hoelang u Echinacin Liquidum moet gebruiken. Zet uw behandeling niet vroegtijdig stop.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Indien U teveel Echinacin Liquidum ingenomen hebt, neem dan onmiddellijk contact op met uw huisarts, uw apotheker of het Anti-Gifcentrum (070/245.245).

Tot op heden werd geen enkel geval van intoxicatie door overdosering gerapporteerd. In geval van overdosering, zal het innemen van het geneesmiddel stopgezet worden.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Echinacin Liquidum

Geen enkel effect dat verschijnt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer zeldzaam kunnen zich overgevoeligheidsreacties voordoen. Voor samenstellingen die Echinacea bevatten werden huiduitslag, jeuk, zelden zwelling in het aangezicht, ademhalingsmoeilijkheden, vertigo en hypotensie gerapporteerd.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ECHINACIN LIQUIDUM?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

De flacon goed sluiten, buiten het licht en op kamertemperatuur bewaren, tussen +15°C en +25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket, de doos, de fles na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel ?

- De werkzame stof in dit middel is het perssap van de Echinacea purpurea (L) Moench plant.
- De andere stof in dit middel is 96 % V/V alcohol.

Bijsluiter

Hoe ziet Echinacin Liquidum er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Glazen fles van 50 of 100 ml drinkbare oplossing

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Madaus Pharma N.V.
Driebomenstraat 16
1180 Brussel
België

Fabrikant : Madaus GmbH ;D-51101Köln, Duitsland

Registratienummer

BE211233

Afleveringswijze

Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in

02/2013