

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Brussel	<b>Ultra-Mg 3 g poeder voor drank</b>
Roundup ID 122234 & ID 176780	Pagina 1 van 4

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

### **Ultra-Mg 3 g poeder voor drank**

Magnesium gluconaat

#### **Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig.
- Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 8 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Ultra-Mg 3 g poeder voor drank en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Ultra-Mg 3 g poeder voor drank niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Ultra-Mg 3 g poeder voor drank?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Ultra-Mg 3 g poeder voor drank?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Ultra-Mg 3 g poeder voor drank en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

- Poeder voor drank in zakjes, in dozen met 20 en 40 zakjes.
- Supplement van magnesiumzouten.
- Dit geneesmiddel is aangewezen bij magnesiumtekort van diverse oorsprong (gebrek aan of te weinig opname van magnesium; te groot verlies langs stoelgang (feces) of urine). Het wordt voorgesteld bij functionele stoornissen te wijten aan een overprikkelbaarheid van de zenuwen en de spieren.

#### **2. Wanneer mag u Ultra-Mg 3 g poeder voor drank niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

##### **Wanneer mag u Ultra-Mg niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- In geval van acute of chronische nierziekte.
- Niet innemen tijdens de maaltijden.

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ultra-Mg?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Wanneer men reeds geneesmiddelen moet gebruiken tegen maagzuur of laxeremiddelen die magnesium bevatten, moet men vermijden Ultra-Mg in te nemen. En dit speciaal in geval van ernstige nierziekte.

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Brussel	<b>Ultra-Mg 3 g poeder voor drank</b>
Roundup ID 122234 & ID 176780	Pagina 2 van 4

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Ultra-Mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Ultra-Mg mag niet tegelijkertijd worden ingenomen met geneesmiddelen die calcium of fosfor bevatten. Indien men een orale behandeling met antibiotica op basis van tetracyclines moet volgen, dan mag Ultra-Mg slechts toegediend worden 3 uren na de inname van het antibioticum.

### **Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?**

Ultra-Mg mag niet tegelijkertijd worden ingenomen met melk.

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Ultra-Mg mag gebruikt worden bij zwangerschap en borstvoeding, als men zich houdt aan de opgegeven dosering en indicatie (zie rubriek “1. Wat is Ultra-Mg 3 g poeder voor drank en waarvoor wordt dit middel gebruikt?”).

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Niet van toepassing.

## **3. Hoe gebruikt u Ultra-Mg 3 g poeder voor drank?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Een zakje Ultra-Mg moet opgelost worden in een glas water en mag niet ingenomen worden tijdens de maaltijden. De behandeling moet voortgezet worden tot het tekort is aangevuld.

De aanbevolen dosering is:

- volwassenen en kinderen boven 10 jaar: 2 of 3 zakjes per dag.

### **Gebruik bij kinderen**

De aanbevolen dosering is:

- kinderen van 5 tot 10 jaar: 1 of 2 zakjes per dag.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 5 jaar.

### **Hebt u te veel van Ultra-Mg gebruikt?**

Wanneer u te veel van Ultra-Mg heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Uw arts weet welke maatregelen in dat geval nodig zouden zijn.

### **Bent u vergeten Ultra-Mg te gebruiken**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

### **Als u stopt met het gebruik van Ultra-Mg**

Niet van toepassing.

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Brussel	<b>Ultra-Mg 3 g poeder voor drank</b>
Roundup ID 122234 & ID 176780	Pagina 3 van 4

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### 4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bij bepaalde gevoelige personen kan Ultra-Mg diarree veroorzaken. Als men de dosis vermindert, zal de diarree ophouden. Irritatie van de slijmvliezen kan eveneens optreden.

##### Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie

EUROSTATION II

Victor Hortaplein, 40/ 40

B-1060 Brussel

Website: [www.fagg.be](http://www.fagg.be)

e-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

#### 5. Hoe bewaart u Ultra-Mg 3 g poeder voor drank?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C).

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

#### 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

##### Welke stoffen zitten er in Ultra-Mg?

- De werkzame stof in Ultra-Mg is magnesium gluconaat 3 g (overeenkomend met 162 mg magnesium of 6,75 millimol).
- De andere stoffen in Ultra-Mg zijn macrogol 6000, colloïdaal siliciumdioxide voor 1 zakje.

##### Hoe ziet Ultra-Mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Poeder voor drank, doos met 20 of 40 zakjes.

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Brussel	<b>Ultra-Mg 3 g poeder voor drank</b>
Roundup ID 122234 & ID 176780	Pagina 4 van 4

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

#### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Melisana nv/sa  
Kareelovenlaan 1  
B-1140 Brussel

#### Fabrikant

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.,  
Estrada Consiglieri Pedroso, 69-B, Queluz  
Barcarena, 2730-055,  
Portugal

#### **Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**

BE070621

#### **Afleveringswijze**

Vrij verkrijgbaar geneesmiddel.

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 01/2014**