

**Benaming :**

C-will 500 mg, harde capsules met verlengde afgifte  
Ascorbinezuur

**Samenstelling :**

*Harde capsules met verlengde afgifte met 500 mg* : Ascorbinezuur 500 mg – Suikergranulaat – Schellak - Wijnsteen zuur – Talk – Gezuiverd water – Ethanol 96% - Chinolinegeel – Titanium dioxide – Gelatine (voor één capsule).

**Farmaceutische vormen en andere voorstellingen :**

- 20, 30, 60 en 90 harde capsules met verlengde afgifte met 500 mg, in te nemen

**Farmacotherapeutische groep :**

Vitamine C

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:**

Will-Pharma, Rue du Manil 80, B-1301 Wavre, België

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:**

BE219055

**Fabrikanten :**

- harde capsules met verlengde afgifte met 500 mg :  
Adare Pharmaceuticals S.r.l., Via Marche 9, 20098 San Giuliano Milanese (Milan)  
Italië en  
Adare Pharmaceuticals S.r.l., Via Martin Luther King, 13, 20060 Pessano con Bornago  
(Milan) Italië

**Aangewezen bij :**

Behandeling van een tekort aan vitamine C : scorbuut en prescorbuut.

**Omstandigheden waarbij het gebruik van het geneesmiddel moet worden vermeden :**

Indien u allergisch bent aan een of meerdere van de bestanddelen van het product moet u geen C-will meer nemen.

Bepaalde ziekten kunnen worden verergerd door het gebruik van grote hoeveelheden vitamine C :

- hyperoxalurie : personen met te veel oxaalzuur in de urine (gevaar voor de vorming van nierstenen);
- ziekten als gevolg van een overbelasting met ijzer (hemochromatose, hemosiderose).

**Bijzondere voorzorgen :**

Patiënten met nierstenen, zullen niet meer dan 500 mg C-will per dag innemen zonder het voordien met hun arts te bespreken.

Diabetici die zelf hun urinesuikergehalte meten, moeten de inname van C-will enkele dagen voor het uitvoeren van zulke tests stopzetten, omdat vitamine C de resultaten kan beïnvloeden.

Informeer uw arts of apotheker indien u

- aan jicht of cystinurie (te veel cystine geëlimineerd met de urine) lijdt,
- aan een andere ziekte lijdt,
- allergisch bent,
- andere geneesmiddelen neemt (zelfs zelfzorggeneesmiddelen).

**Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en voeding :**

Vitamine C verhoogt de resorptie van ijzer. Hiermee moet rekening worden gehouden indien ijzersupplementen worden genomen.

Hoge dosissen vitamine C kunnen de eliminatie van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden (orale contraceptiva, salicylaten, barbituraten, tetracyclines).

Indien u een of meerdere van deze geneesmiddelen inneemt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

**Zwangerschap en borstvoeding :**

C-will mag aan de normale dosis worden ingenomen tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Hoge dosissen worden afgeraden.

**Besturen van voertuigen en gebruik van machines :**

Geen enkel effect is gerapporteerd.

**Hoe gebruiken en hoeveel ?**

De capsule in haar geheel innemen met een glas water.

C-will vóór de maaltijd innemen, liefst 's morgens of 's middags.

Dagdosis (uitgezonderd tegengesteld advies van de arts) :

Volwassenen en jongeren : bij tekort aan vitamine C of gastro-intestinale aandoeningen met slechte opname : 500 mg à 1 g per dag.

In het algemeen volstaat een gezonde voeding om aan de vitamine C-behoeften te voldoen. [Volgens het NRC (1989) bedragen de dagelijkse innames om een tekort aan vitamine C

(scorbuut) te voorkomen

0- 6 maand	30 mg	15 jaar en meer	60 mg
7-12 maand	35 mg	zwangerschap	70 mg
1- 3 jaar	40 mg	borstvoeding	
4-10 jaar	45 mg	tot 6 maanden	95 mg
11-14 jaar	50 mg	na 6 maanden	90 mg]

**Maatregelen bij gebruik van te grote hoeveelheden :**

Tot op heden zijn er geen gevallen van overdosering gekend.

**Ongewenste effecten :**

Na inname van zeer hoge dosissen (4 à 5 g en meer) werd in sommige gevallen een lichte vorm van diarree of een verhoogde urinaire frequentie gezien. Urine kan aanzuren, hetgeen problemen kan veroorzaken bij personen die te veel oxaalzuur met de urine uitscheiden. Bij personen met aanleg voor vorming van nierstenen kunnen hoge dosissen een crisis uitlokken. Zeldzame allergische reacties werden gerapporteerd.

Indien andere ongewenste effecten optreden, verwittig dan uw arts of apotheker.

**Bewaring :**

C-will bewaren buiten het bereik van kinderen.

De harde capsules worden bewaard bij een temperatuur niet hoger dan 25°C.

De vervaldatum staat op de verpakking gedrukt na de letters EX (die "vervaldatum" betekenen). De twee eerste cijfers geven de vervalmaand aan (laatste dag), de vier laatste cijfers geven het vervaljaar aan.

Dit geneesmiddel mag niet meer worden gebruikt na die datum.

**Afleveringswijze:**

Vrije aflevering

**Datum van de laatste herziening van de bijsluiter :** 08.2016

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 09/2016.