
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Curapeg 13,8 g, poeder voor drank

Macrogol 3350, Natriumchloride, Natriumwaterstofcarbonaat, Kaliumchloride

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Curapeg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Wat is Curapeg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De naam van dit geneesmiddel is "Curapeg 13,8 g poeder voor drank". Het is een laxeermiddel voor de behandeling van chronische constipatie (verstopping) en bij zeer erge constipatie, fecale impactie genoemd, bij volwassenen, adolescenten en ouderen. Het is niet aangeraden voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Het helpt u om een gemakkelijkere stoelgang te maken zelfs als u reeds gedurende lange tijd geconstipeerd bent.

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Als u een perforatie van de darmwand heeft.
- Als u een blokkering van uw darmen (obstructie van de darmen, ileus) heeft.
- Als u een ernstige ontstekingsziekte van de darmen heeft zoals colitis ulcerosa, ziekte van Crohn of toxisch megacolon.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Bij het gebruik van Curapeg moet u voldoende vocht blijven innemen. De Curapeg-oplossing is geen vervanging voor de reguliere vochtinname.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Curapeg nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Sommige geneesmiddelen, bijv. anti-epileptica (geneesmiddelen voor epilepsie), kunnen mogelijk minder goed werken tijdens het gebruik van Curapeg.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Curapeg kan tijdens de zwangerschap en borstvoeding gebruikt worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Curapeg beïnvloedt uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen niet.

Curapeg bevat kalium, natrium en sorbitol.

Curapeg bevat 0,63 mmol (25 mg) kalium per zakje. Dit moet in rekening gebracht worden wanneer u meer dan één zakje per dag inneemt en indien u lijdt aan een verminderde nierfunctie, of indien u een kaliumarm dieet volgt.

Curapeg bevat 8,1 mmol (187 mg) natrium per zakje. Dit moet in rekening gebracht worden indien u een natriumarm dieet volgt.

De citroen-limoensmaak in *Curapeg* bevat sorbitol. Indien uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, contacteer dan uw arts alvorens u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe neemt u dit middel in?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dit geneesmiddel kan op elk moment ingenomen worden, met of zonder voedsel.

Volwassenen, adolescenten (boven 12 jaar) en ouderen

Chronische constipatie (constipatie gedurende een lange periode)

De aanbevolen dosis voor constipatie is 1 zakje, een- tot driemaal per dag naargelang de ernst van uw constipatie.

Fecale impactie (ernstige, volledige verstopping)

Alvorens dit geneesmiddel in te nemen voor fecale impactie, moet uw arts bevestigen dat u deze aandoening heeft.

De aanbevolen dosis voor de behandeling van fecale impactie (volledige, ernstige constipatie) is 8 zakjes *Curapeg* per dag. De 8 zakjes moeten iedere dag binnen de 6 uur ingenomen worden. De behandeling moet, indien nodig, tot 3 dagen verder gezet worden.

Patiënten met een hartaandoening

Neem niet meer dan 2 zakjes in één uur.

Gebruik bij kinderen (onder 12 jaar)

Curapeg is niet aanbevolen voor kinderen onder 12 jaar. Er zijn alternatieve producten beschikbaar voor kinderen.

Wijze van toediening

Open het zakje en giet de inhoud ervan in een glas. Voeg ongeveer 125 ml water aan het glas toe. Roer goed tot al het poeder opgelost is en de Curapeg-oplossing helder of lichtjes troebel is, en drink vervolgens de oplossing op. Als u Curapeg inneemt voor fecale impactie, kan het gemakkelijker zijn om alle 8 zakjes in 1 liter water op te lossen en op te drinken gespreid over een periode van 6 uur. De gereconstitueerde oplossing moet afgedekt worden en bewaard in de koelkast (2°C - 8°C).

Behandelingsduur

Constipatie:

Een behandeling van constipatie met Curapeg duurt gewoonlijk ongeveer 2 weken.

Als u een langdurige constipatie heeft of uw constipatie wordt veroorzaakt door een ziekte zoals de ziekte van Parkinson of multiple sclerose (MS), of als u geneesmiddelen neemt die constipatie veroorzaken, kan uw dokter u aanbevelen om Curapeg langer dan 2 weken te nemen. In dit geval kan uw arts de dosis verlagen tot 1 of 2 zakjes per dag.

Fecale impactie:

Een behandeling met Curapeg kan tot 3 dagen duren.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

U zou overvloedige diarree kunnen krijgen die tot dehydratie kan leiden. In dit geval dient u te stoppen met het innemen van Curapeg en voldoende te drinken. Als u zich zorgen maakt, neem dan contact op met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem de dosis zo snel mogelijk in als u eraan denkt en ga dan verder zoals voordien. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Om het meeste voordeel te halen uit Curapeg, moet u de behandeling altijd beëindigen zoals is voorgeschreven in deze bijsluiter of volgens de aanwijzingen van uw arts of apotheker. Dit zal ervoor zorgen dat uw constipatie verdwijnt, anders kunnen uw symptomen blijven bestaan.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u last van één van de volgende bijwerkingen, stop dan met het innemen van Curapeg en raadpleeg uw arts onmiddellijk:

- tekenen van een allergische reactie, zoals kortademigheid, ademhalingsmoeilijkheden of opzwellen van het gezicht, de lippen, de tong en de keel, netelroos, jeuk, huiduitslag of roodheid van de huid.
- tekenen van een verandering in de vocht- of elektrolytenbalans van uw lichaam, zoals opzwellen (vooral van de enkels), zwak gevoel, toegenomen vermoeidheid of toegenomen dorst met hoofdpijn.

De volgende bijwerkingen zijn ook mogelijk:

- maagpijn
- rammelende maag
- diarree. Bij het begin van de behandeling met Curapeg kunt u last krijgen van een lichte diarree die in het algemeen verbetert wanneer u het aantal zakjes dat u inneemt vermindert).

-
- braken
 - misselijkheid
 - pijn aan de anus (onaangenaam gevoel aan het zitvlak)
 - opzwellen van de buik
 - winderigheid
 - zwelling van de handen, voeten of enkels
 - hoofdpijn
 - indigestie
 - hoge of lage kaliumspiegels in het bloed.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het zakje na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat één van de zakjes beschadigd is.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Wanneer *Curapeg* is opgelost in water en niet onmiddellijk kan opgedronken worden, moet de oplossing afgedekt bewaard worden in de koelkast (2°C – 8°C), en de oplossing moet binnen de 24 uur gebruikt worden. Eventueel niet gebruikte oplossing moet na 24 uur weggegooid worden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u moet geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn macrogol 3350 (13,125g), natriumchloride (0,3507 g), natriumwaterstofcarbonaat (0,1785 g) en kaliumchloride (0,0466 g).

De andere stoffen in dit middel zijn watervrij colloïdaal silicium, natriumsaccharine, sinaasappelaroma (bevat smaakstoffen, natuurlijke smaakstoffen, maltodextrine, acaciagom, α -tocoferol), citroen/limoenaroma (bevat natuurlijke citroenolie, natuurlijk poederaroma van citroen, poederaroma van limoen, maltodextrine, mannitol, gluconolactone, sorbitol, acaciagom, watervrij colloïdaal silicium).

Hoe ziet Curapeg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Curapeg is een wit poeder.

Elk zakje bevat 13,8 g poeder en is verpakt in zakjes. Het is beschikbaar in dozen van 20, 30 en 50 zakjes.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Pharma Belgium N.V.

Laarstraat 16

B-2610 Wilrijk

Fabrikant

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, Duitsland

Hermes Pharma Ges.m.b.H., Allgäu 36, 9400 Wolfsberg, Oostenrijk

TEVA Pharma B.V., Swensweg 5, 2031 Haarlem, Nederland

Klocke Pharma-Service GmbH, Straßburger Straße 77, 77767 Appenweier, Duitsland

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

BE449706

Afleveringswijze

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

BE: Curapeg 13,8g poeder voor drank

IE: Tevalax 13.8g powder for oral solution

NL: Macrogol en electrolyten ratiopharm 13,8 g poeder voor drank

UK: Macilax 13.8g powder for oral solution

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 02/2017.