

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.



- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 4 à 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Waarvoor wordt Bromex gebruikt?
2. Wanneer mag u Bromex niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Bromex in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Bromex?
6. Aanvullende informatie.

1. WAARVOOR WORDT BROMEX GEBRUIKT?

Bromex hoort bij de groep geneesmiddelen die slijm in de luchtwegen, neus en luchtpijptakken vloeibaar maakt.

Bromex wordt toegepast bij de behandeling van aandoeningen van de luchtwegen die gepaard gaan met afscheiding van kleverig slijm: acute en chronische bronchitis, ontsteking van de luchtpijp en de luchtpijpvertakkingen (tracheobronchitis), chronische aandoeningen van de longen en de luchtpijpvertakkingen (chronische bronchopulmonale aandoeningen); acute en chronische ontsteking van de neusbijholte (sinusitis). Bromex wordt ook gebruikt bij droge ogen (keratoconjunctivitis sicca, syndroom van Sjögren). Bromex is suikervrij en mag dus gebruikt worden door suikerzieken.

2. WANNEER MAG U BROMEX NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Bromex niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Bromex?

- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Bromex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Bromex mag gedurende de zwangerschap en tijdens de borstvoeding worden gebruikt, behalve wanneer de arts dit afraadt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Stoffen in Bromex waarmee u rekening moet houden

- Dit geneesmiddel bevat sorbitol. Als u van uw arts weet dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voor inname van dit geneesmiddel.
- Dit geneesmiddel bevat methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat, deze stoffen kunnen allergische reacties uitlokken.
- Dit geneesmiddel bevat propyleenglycol wat gelijkaardige effecten als alcohol kan veroorzaken.

3. HOE NEEMT U BROMEX IN?

Gebruik Bromex altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Toedieningsweg: oraal gebruik. De siroop mag niet verdund worden en moet na de maaltijd worden ingenomen.

De gebruikelijke dosering is:

- Volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar: 3 x per dag 10 - 15 ml (2 koffielepels tot 1 eetlepel)
- Kinderen van 10 tot 15 jaar: 3 x per dag 10 ml (2 koffielepels)
- Kinderen van 5 tot 10 jaar: 3 x per dag 5 ml (1 koffielepel)
- Kinderen van 2 tot 5 jaar: 2 tot 3 x per dag 2 ml tot 5 ml (1/2 tot 1 volle koffielepel), afhankelijk van het gewicht van het kind.

Bromex wordt goed verdragen en mag dus bij chronische gevallen lange tijd zonder nadelen worden gebruikt.

U mag Bromex echter niet langer dan 7 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Heeft u te veel van Bromex ingenomen?

Wanneer u teveel van Bromex heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bij inname van een veel te grote hoeveelheid, kan een daling van de bloeddruk optreden.

Bent u vergeten Bromex in te nemen?

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Als u stopt met het innemen van Bromex

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Zoals elk geneesmiddel kan Bromex bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bromex wordt in het algemeen goed verdragen, zowel op korte als op lange termijn.

Erg zeldzaam: misselijkheid, zwaartegevoel in de maag.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U BROMEX?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Bewaren beneden 25°C. Gebruik Bromex niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket/de doos na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

6. AANVULLENDE INFORMATIE.

Welke stoffen zitten er in Bromex?

- De werkzame stof in Bromex is: broomhexine hydrochloride 5 mg/5 ml.
- De andere stoffen in Bromex zijn: L-wijnsteenzuur - sucralose - sorbitol 70% oplossing kristalliseerbaar - methylparahydroxybenzoaat - propylparahydroxybenzoaat - propyleenglycol - frambozenaroma - gezuiverd water.

Hoe ziet Bromex eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Bromex is beschikbaar in de vorm van siroop.

Verkrijgbaar in een fles van 180 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE155364

Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 10/2009.