

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

TRIBVIT, tabletten

Foliumzuur, cyanocobalamine (B₁₂), pyridoxinehydrochloride (B₆)

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u TriBvit zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1. Wat is TriBvit en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u TriBvit inneemt
3. Hoe wordt TriBvit ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u TriBvit
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS TRIBVIT EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

TriBvit bevat 3 vitamines B (foliumzuur, vitamine B₆, en vitamine B₁₂). Vitamines B zijn van belang voor het behoud van de natuurlijke celfuncties. TriBvit is aangewezen bij het voorkomen van de verschijnselen van een tekort aan vitamine B₆, vitamine B₁₂ en foliumzuur veroorzaakt door te weinig eten of een verstoorde opname van voedingsstoffen, voornamelijk bij ouderen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U TRIBVIT INNEEMT

Neem TriBvit niet in

- Bij allergie (overgevoeligheid) voor de werkzame bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen van TriBvit.
- Ter preventie van een neuraalbuisdefect (onvolledige sluiting van de neurale buis tijdens de embryonale ontwikkeling) als u bij een vorige zwangerschap een kindje met deze afwijking hebt gehad, want hiervoor moet de toegediende dosis foliumzuur hoger zijn dan deze bevat in TriBvit.

Wees extra voorzichtig met TriBvit

- TriBvit is niet bedoeld voor de behandeling van de symptomen van een tekort van de betrokken vitamines.
- Sommige anemieën (tekort aan rode bloedcellen) kunnen doeltreffend behandeld worden door injectie van vitamine B₁₂.
- TriBvit mag niet gebruikt worden als grote gedeeltes van de dunne darm operatief zijn verwijderd
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek "Inname met andere geneesmiddelen" te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Inname met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

- Foliumzuur vermindert de werkzaamheid van bepaalde middelen die bij epilepsie (vallende ziekte) gebruikt worden, zoals fenobarbital en fenytoïne.
- Het effect van foliumzuur kan verminderd worden door middelen die het foliumzuurmetabolisme beïnvloeden, zoals methotrexate, trimethopim en pyrimethamine.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

TriBvit heeft geen negatief effect op de zwangerschap.

TriBvit heeft geen negatief effect op het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

TriBvit heeft geen effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.

3. HOE WORDT TRIBVIT INGENOMEN

Volg bij het innemen van TriBvit nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.

Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.

Het normale gebruik is 1 tablet per dag. De tabletten mogen gekauwd worden of in hun geheel doorgeslikt.

Wat moet u doen als u meer van TriBvit heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van TriBvit heeft ingenomen, of als een kind per vergissing een tablet heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts of apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten TriBvit in te nemen

Mocht u 1 dosis vergeten hebben in te nemen, dan moet u deze alsnog innemen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.

Als u stopt met het innemen van TriBvit

Uw arts zal u vertellen hoe lang u TriBvit moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat de werking onvoldoende zal zijn.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan TriBvit bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Indien u het geneesmiddel aan de aanbevolen dosis neemt is het risico op ongewenste effecten kleiner.

In zeldzame gevallen (minder dan 1 patiënt op 1000) kunnen huideffecten optreden zoals acne-achtige verschijnselen en allergische verschijnselen (rode huid, jeuk).

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U TRIBVIT

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen vocht.

Gebruik TriBvit niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Lege doosjes kunnen via de papierophaling gerecycleerd worden. Flesjes en dopjes zijn te sorteren bij de verpakkingen uit hard plastic.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat TriBvit

De werkzame bestanddelen zijn: foliumzuur 0,8 mg; cyanocobalamine (vitamine B₁₂) 0,5 mg; pyridoxinehydrochloride (vitamine B₆) 3,0 mg.

De andere bestanddelen zijn: calciumwaterstoffosfaatdihydraat, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycollaat, magnesiumstearaat, colloïdaal watervrij siliciumdioxide.

Hoe ziet TriBvit er uit en wat is de inhoud van de verpakking

TriBvit tabletten zijn rond, vaalgeel met kleine stipjes, met een diameter van 10 mm, en verpakt per 30, 60, 100 of 250 stuks in een plastic flesje met schroefdop.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

TrioBe (Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden)

TriBvit (België)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Recip AB, Box 906, 170 09 Solna, Zweden

Vertegenwoordiger in België:

Meda Pharma nv. - Terhulpssteenweg 166 - 1170 Brussel

Fabrikant:

Recipharm Stockholm AB, Lagervägen 7, SE-136 50 Jordbro, Zweden

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

BE 244517

Afleveringswijze

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift

Laatste bijwerking van de bijsluiter: september 2010.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2010.