

CEDIUM BENZALKONIUM 0,1 %, oplossing

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u CEDIUM BENZALKONIUM zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.



- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 3 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1. Wat is CEDIUM BENZALKONIUM 0,1 %, oplossing en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u CEDIUM BENZALKONIUM 0,1 %, oplossing gebruikt?
3. Hoe wordt CEDIUM BENZALKONIUM 0,1 %, oplossing gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u CEDIUM BENZALKONIUM 0,1 %, oplossing?
6. Aanvullende informatie.

1. Wat is CEDIUM BENZALKONIUM 0,1 %, oplossing en waarvoor wordt het gebruikt?

Ontsmettende oplossing voor plaatselijk uitwendig gebruik op de huid. CEDIUM BENZALKONIUM wordt gebruikt om kleine kwetsuren, oppervlakkige wondjes, snijwondjes, schrammen, brandwondjes en insectenbeten te ontsmetten en om de huid te reinigen vóór het aanbrengen van een pleister, om ontstekingen te voorkomen.

2. Wat moet u weten voordat u CEDIUM BENZALKONIUM 0,1 %, oplossing gebruikt?

Gebruik CEDIUM BENZALKONIUM niet ...

- Als u overgevoelig bent aan de actieve stof en elk ander quaternair ammoniumderivaat.
- Bij aanwezige allergische aandoeningen: huiduitslag, huidvlekken, prikkelingen.
- Samen met zeep of hard water.
- Op slijmvliezen (vooral de ogen).
- Samen met een afsluitend verband.

Wees extra voorzichtig met CEDIUM BENZALKONIUM ...

- Dat u het niet inslikt.
- Dat u het niet langdurig of herhaald gebruikt.
- Want als u een huidletsel hebt dat samengaat met koorts, dan is een algemene behandeling tegen infecties vereist.
- Want bloed en etter kunnen de werkzaamheid van dit product verminderen.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek "Gebruik met andere geneesmiddelen" te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Niet samen gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen.

Gebruik van CEDIUM BENZALKONIUM met voedsel en drank

Geen bijzondere voorzorgen nodig.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt/gebruikt.

Dit geneesmiddel is bestemd voor een plaatselijke uitwendige behandeling. Het kan worden gebruikt tijdens zwangerschap en borstvoeding, op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de genoemde voorzorgen.

Het wordt echter aangeraden de behandelende arts hiervan op de hoogte te brengen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Geen bijzondere voorzorgen nodig.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van CEDIUM BENZALKONIUM

Niet van toepassing.

3. Hoe wordt CEDIUM BENZALKONIUM 0,1 %, oplossing gebruikt?

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.

Spray: verstuif de oplossing 2 à 3 maal per dag op de wond.

Flacon met druppelteller: breng 2 à 3 maal per dag enkele druppels rechtstreeks aan op de wond of met behulp van een steriel kompres.

Laten drogen zonder af te vegen.

Als u de huid eerst met water en zeep moet wassen, grondig spoelen om alle zeepsporen te verwijderen.

De toepassing na elke wasbeurt herhalen. Dit product maakt geen vlekken.

De duur van de behandeling zo kort mogelijk houden. Als er geen verbetering is na 3 dagen kan u best een arts raadplegen. Uw arts zal u vertellen hoe lang u CEDIUM BENZALKONIUM moet gebruiken.

Wat moet u doen als u meer van CEDIUM BENZALKONIUM heeft gebruikt dan u zou mogen

Bij lokaal, uitwendig gebruik zijn de risico's op overdosering zeer klein. Overdosering kan optreden wanneer, door onvoorzichtigheid of onoplettendheid, een grote hoeveelheid van de oplossing wordt ingeslikt. Wanneer u CEDIUM BENZALKONIUM heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Volgende symptomen kunnen optreden: misselijkheid, braken, ademhalingsmoeilijkheden. Behandeling: de persoon melk laten drinken. Opname in het ziekenhuis kan noodzakelijk zijn.

Wat moet u doen wanneer u CEDIUM BENZALKONIUM vergeet te gebruiken

Er zijn geen bijzondere maatregelen nodig.

Als u stopt met gebruik van CEDIUM BENZALKONIUM

Er zijn geen bijzondere maatregelen nodig.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Zoals alle geneesmiddelen kan CEDIUM BENZALKONIUM bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

- Bij contact met de slijmvliezen (ogen) is een irriterend of branderig gevoel mogelijk.
- Bij veelvuldig of langdurig gebruik bestaat het risico van toenemende gevoeligheid van de huid.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u CEDIUM BENZALKONIUM 0,1 %, oplossing?

CEDIUM BENZALKONIUM buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Gebruik CEDIUM BENZALKONIUM niet meer na de vervaldatum achter "EXP" op het etiket/de buitenverpakking. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De vervaldag is de laatste dag van de vermelde maand.

6. Aanvullende informatie.

Wat bevat CEDIUM BENZALKONIUM

De werkzame stof is benzalkoniumchloride 50% 2,0 mg

Andere bestanddelen zijn natriumedetaat - dinatriumwaterstoffosfaat dihydraat - mononatriumdwaterstoffosfaat dihydraat - natriumchloride - gezuiverd water q.s. ad 1 ml.

Hoe ziet CEDIUM BENZALKONIUM eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Flacon met 30 ml oplossing met druppelteller. Spray met 50 ml oplossing.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem

Registratienummers: 276 S42 F11 (Flacon met druppelteller) 276 S761 F11 (Spray)

Vrij verkrijgbaar in de apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 10.2007.

De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is 12.2007