

**BIJSLUITER**  
(Réf. 12.12.2017 – PRAC + MAT + RQ)  
(CCDS 0234-09)

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

### **Mucoangin Citroen 20 mg zuigtabletten** ambroxolhydrochloride

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Mucoangin Citroen en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Mucoangin Citroen en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

Ambroxolhydrochloride is het werkzame bestanddeel van Mucoangin Citroen. Dit werkzame bestanddeel in de zuigtablet geeft het therapeutisch effect dat u wilt bereiken.

Het is de lokale verdovende werking van Mucoangin Citroen die de acute keelpijn verlicht.

Mucoangin Citroen wordt gebruikt om:

- acute keelpijn te verlichten.

#### **2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

##### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor ambroxolhydrochloride of voor een van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Als u lijdt aan de zeldzame erfelijke aandoening fructose-intolerantie.

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- U mag Mucoangin Citroen niet langer dan 3 dagen gebruiken. Als u nog symptomen heeft na 3 dagen of als u hoge koorts heeft, raadpleeg dan een arts.
- Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg hem dan vooraleer u dit geneesmiddel gebruikt. Zie ook "Mucoangin Citroen bevat sorbitol en sacharose".
- Als u problemen heeft aan de lever of nieren, raadpleeg dan uw arts voordat u Mucoangin Citroen gaat gebruiken.
- Mucoangin Citroen is niet aangewezen voor de behandeling van pijnlijke mondletsels (bijv. zweren of wonden). In dergelijke gevallen moet u een arts raadplegen.
- Kortademigheid (dyspneu) kan zich voordoen als gevolg van een onderliggende aandoening (bijv. een opgezette keel). Een andere oorzaak zou een gevoel van beklemming in de keel kunnen zijn door de lokale verdovende werking van Mucoangin Citroen. Nog een andere oorzaak kan een allergische reactie zijn waardoor uw mond en keel opzwellen.

- Uw keel en uw mond kunnen minder gevoelig lijken dan normaal (verdooving).
- Er zijn meldingen gedaan van ernstige huidreacties die gerelateerd zijn aan de toediening van ambroxolhydrochloride. Als u huiduitslag krijgt (waaronder beschadiging van de slijmvliezen, bijvoorbeeld van de mond, keel, neus, ogen of bij de geslachtsorganen), stop dan met het gebruik van Mucoangin Citroen en neem direct contact op met uw arts.

### **Kinderen**

Als u jonger bent dan 12 jaar, mag u Mucoangin Citroen niet gebruiken.

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Mucoangin Citroen nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Ambroxol gaat over in het lichaam van het ongeboren kind. U mag Mucoangin Citroen niet innemen als u zwanger bent, vooral niet tijdens de eerste drie maanden.

Ambroxol gaat over in de moedermelk. U mag Mucoangin Citroen niet innemen als u borstvoeding geeft.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er zijn geen effecten van Mucoangin Citroen bekend op uw rijvaardigheid en op uw vermogen om machines te bedienen.

### **Mucoangin Citroen bevat sorbitol en sacharose.**

Eén zuigtablet bevat 1,37 g sorbitol (8,2 g sorbitol per maximaal aanbevolen dagelijkse dosering) en 6,3 mg sacharose (37,8 mg per maximaal aanbevolen dagelijkse dosering), die een bron van fructose (een soort suiker) zijn. Als u lijdt aan fructose-intolerantie, mag u dit geneesmiddel niet innemen.

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg hem dan vooraleer u dit geneesmiddel inneemt.

## **3. Hoe gebruikt u dit middel?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1 zuigtablet opzuigen als u de pijn wil verlichten. U mag niet meer dan 6 zuigtabletten per dag gebruiken.

Gebruik Mucoangin Citroen niet langer dan 3 dagen. Als de symptomen aanhouden na 3 dagen of als u hoge koorts hebt, raadpleeg een arts.

Klinische gegevens hebben een snelle werking aangetoond (ten laatste binnen de 20 minuten). De werking houdt tenminste 3 uur aan.

### **Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

Als u te veel zuigtabletten heeft gebruikt (meer dan 6 per dag) en u neemt symptomen van overdosering waar, vraag dan om advies van uw arts of apotheker, of contacteer het Antigifcentrum (070/245.245).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### 4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

**Als één van de volgende bijwerkingen zich voordoet, stop dan met het gebruik van Mucoangin Citroen en neem onmiddellijk contact op met uw arts:**

- allergische reacties met lokale zwellingen van het gezicht, de lippen, mond, tong en/of keel (angio-oedeem). Dit kan een beklemmend gevoel in de keel veroorzaken en moeite met slikken of ademen.
- Snel opkomende allergische reacties van het hele lichaam (anafylactische reacties inclusief anafylactische shock).

De ernst van de allergische reactie kan toenemen als u het geneesmiddel opnieuw inneemt of als u een geneesmiddel inneemt met dezelfde actieve stof (zie rubriek 2 "*Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn*").

Overige bijwerkingen die zich kunnen voordoen:

**Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)**

- zich ziek voelen (misselijkheid)
- gevoelloze mond, tong en keel (orale en faryngeale hypoesthesie)
- smaakstoornissen (dysgeusie)

**Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)**

- diarree
- indigestie (dyspepsie)
- buikpijn (pijn in de bovenbuik)
- droge mond

**Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)**

- overgevoeligheidsreacties
- huiduitslag, netelroos
- droge keel.

**Niet bekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld)**

*(een precieze frequentie schatting is niet mogelijk, omdat de bijwerkingen niet opgetreden zijn in een klinisch onderzoek van 1226 patiënten. De frequentie categorie is waarschijnlijk niet groter dan 'soms', maar kan wellicht lager zijn)*

- anafylactische reacties waaronder anafylactische shock, angio-oedeem (zich snel ontwikkelende zwelling van de huid, onderhuid, slijmvliezen of weefsels onder de slijmvliezen) en jeuk
- ernstige bijwerkingen van de huid (waaronder erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom/toxische epidermale necrolyse en acute gegeneraliseerde exantheemateuze pustulose).
- braken

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiters staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

*België*

Website: [www.fagg.be](http://www.fagg.be)

e-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

Luxemburg

Site internet: <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **5. Hoe bewaart u dit middel?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterfolie na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

De werkzame stof in dit middel is: ambroxolhydrochloride.

Eén zuigtablet bevat 20 mg ambroxolhydrochloride.

De andere stoffen in dit middel zijn:

- Citroen-aroma (dat sacharose bevat)
- Frescofort-aroma
- Sorbitol (E420)
- Sucralose
- Macrogol 6000
- Talk

### **Hoe ziet Mucoangin Citroen 20 mg zuigtabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Dit geneesmiddel wordt gepresenteerd in ronde, witte tabletten met afgeschuinde randen. Beide zijden zijn plat.

De zuigtabletten zijn beschikbaar in aluminium/aluminium blisterverpakking.

Dozen met 12, 18, 24, 30, 36, 42 en 48 zuigtabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

#### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Sanofi Belgium

Leonardo Da Vincilaan 19

1831 Diegem

Tel.: 02/710.54.00

E-mail: [info.belgium@sanofi.com](mailto:info.belgium@sanofi.com)

#### Fabrikant:

Delpharm Reims

10 Rue Colonel Charbonneaux

51100 Reims

Frankrijk

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:** BE423263

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift

**Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:**

België, Luxemburg: Mucoangin® Citroen

Cyprus, Giekenland: Lysopadol®

Denemarken: Mucoangin® Citron

Duitsland: Mucoangin® gegen Halsschmerzen Zitrone

Frankrijk: Lysopaïne® Maux de gorge Ambroxol Citron 20 mg sans sucre, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose

Ierland : Lysopadol® Lemon

Italië: Zerinol gola

Nederland: Mucoangin® Citroen

Oostenrijk: Mucoangin® Zitrone

Spanje: Lizipadol®

Zweden: Mucoangin® Citron

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2017**