

**PE-TAM volwassenen, 500 mg, tabletten
paracetamol**

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.



- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Waarvoor wordt Pe-Tam volwassenen gebruikt?
2. Wanneer mag u Pe-Tam volwassenen niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Pe-Tam volwassenen in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Pe-Tam volwassenen?
6. Aanvullende informatie.

1. WAARVOOR WORDT PE-TAM VOLWASSENEN GEBRUIKT?

Pe-Tam volwassenen behoort tot de groep van pijnstillende en koortswerende geneesmiddelen. Het is aangewezen bij de symptomatische behandeling van koorts en pijn.

2. WANNEER MAG U PE-TAM VOLWASSENEN NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Pe-Tam volwassenen niet gebruiken?

- Voorzichtigheidshalve dit geneesmiddel niet toedienen wanneer de arts bewezen heeft dat de lever aangetast is.
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- U bent allergisch voor fenacetine.
- Bij chronisch alcoholisme.
- Bij glucose-6-fosfaat-dehydrogenasedeficiëntie (erfelijke aandoening).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Pe-Tam volwassenen?

- Pe-Tam volwassenen bevat paracetamol. De voorgeschreven of aanbevolen doses niet overschrijden; noch de behandeling verlengen.
Niet langer dan tien dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.
- Voorzichtigheid is geboden bij verminderde lever- en nierfunctie.

- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek te lezen: "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?".

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Pe-Tam volwassenen nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

- Tijdens de behandeling met paracetamol best geen slaap- of kalmeermiddelen gebruiken die barbituraten bevatten.
- Bij gelijktijdig gebruik van paracetamol en chlooramfenicol (een antibioticum) moet de dosis van het antibioticum aangepast worden.
- Paracetamol kan in associatie met anticoagulantia (anti-bloedstollende middelen) gebruikt worden. Toch kan de inname van meer dan 2 g paracetamol per dag gedurende een lange periode het risico op bloedingen verhogen en is een regelmatige controle van de International Normalised Ratio (INR) vereist.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Tijdens de behandeling met paracetamol best geen alcohol gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Er zijn geen aanwijzingen dat Pe-Tam volwassenen niet gebruikt mag worden tijdens zwangerschap en lactatie. Voorzichtigheid is toch aan te raden gedurende de eerste drie maanden van de zwangerschap.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Geen bijzondere voorzorgen nodig.

Stoffen in Pe-Tam volwassenen waarmee u rekening moet houden

Niet van toepassing.

3. HOE NEEMT U PE-TAM VOLWASSENEN IN?

Gebruik Pe-Tam volwassenen altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

- In normale omstandigheden 1-2 tabletten, per keer, maximaal 3-6 tabletten per dag.
- Tussen twee innamen moet men tenminste 4 uur wachten.
- Personen met een gevoelige lever mogen ten hoogste 3 tabletten per dag innemen.
- De tablet als dusdanig innemen met een glas water, ofwel vooraf in een weinig water laten oplossen en na inname een glas water drinken.

Toedieningsweg: oraal.

Heeft u te veel van Pe-Tam volwassenen ingenomen?

Wanneer u te veel van Pe-Tam volwassenen heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

- Inname van 20 à 30 tabletten in één keer door gezonde volwassenen, kan de lever ernstig en onherstelbaar beschadigen. Bij mensen met leveraandoeningen (bijvoorbeeld bij alcoholisme) is zo een leveraantasting al mogelijk na inname van een kleinere hoeveelheid.
- Als zich dergelijke gevallen voordoen moet het slachtoffer zo snel mogelijk naar een kliniek overgebracht worden, ook als er op het eerste zicht geen vergiftigingsverschijnselen optreden (misselijkheid, braken, verlies van eetlust, buikpijn).
- Tekenen van leverbeschadiging kunnen nog optreden tot 6 dagen na de inname van een overdosis paracetamol.

Bent u vergeten Pe-Tam volwassenen in te nemen?

Geen bijzondere voorzorgen nodig.

Als u stopt met het innemen van Pe-Tam volwassenen

Geen bijzondere voorzorgen nodig.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Zoals elk geneesmiddel kan Pe-Tam volwassenen bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

In therapeutische dosering gebruikt, heeft dit geneesmiddel weinig bijwerkingen.

Zeldzame huidreacties (overgevoeligheid) werden genoteerd.

In dat geval zal men de toediening stopzetten, en een arts of apotheker raadplegen.

Uiterst zelden kan bij voorbeschikte personen astma optreden.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U PE-TAM VOLWASSENEN?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C), in zijn oorspronkelijke, goed gesloten verpakking, op een droge plaats en verwijderd van elke warmtebron. Gebruik Pe-Tam volwassenen niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking of de doos na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

6. AANVULLENDE INFORMATIE.

Welke stoffen zitten er in Pe-Tam volwassenen?

- De werkzame stof in Pe-Tam volwassenen is: paracetamol 500 mg.
- De andere stoffen in Pe-Tam volwassenen zijn: aardappelzetmeel - colloïdaal siliciumdioxide – magnesiumstearaat - polyvinylpyrrolidon.

Hoe ziet Pe-Tam volwassenen eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Doos met 20 tabletten in blisterverpakking.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 BORNEM - België

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE134845

Vrije aflevering.

Deze bijsluiters is goedgekeurd in 05/2011.