

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Tymaki gompastilles droog extract van tijmkruid

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft vertelt.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Tymaki gompastilles en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS TYMAKI GOMPASTILLES EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Geneesmiddel op basis van plantenextracten gebruikt als expectorans bij hoest, geassocieerd met verkoudheid.

Het gebruik van dit traditioneel geneesmiddel op basis van plantenextracten in deze indicatie is uitsluitend gebaseerd op een langdurige gebruikservaring.

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor tijm of andere Lamiaceae (lipbloemen), berk, bijvoet, selderij of een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Bij patiënten met bronchiaal astma of andere aandoeningen van de luchtwegen die gepaard gaan met een sterke overgevoeligheid van de luchtwegen. Het gebruik van Tymaki gompastilles kan ademnood veroorzaken of een astma-aanval uitlokken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Bij klachten die langer dan één week aanhouden, of bij optreden van ademnood, koorts en etterige of bloederig slijm moet meteen een arts worden geraadpleegd.

Kinderen

BIJSLUITER

Bij kinderen jonger dan 12 jaar mag Tymaki gompastilles niet worden gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Tymaki gompastilles nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Geen wisselwerkingen gekend.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Bij gebrek aan voldoende gegevens mag Tymaki gompastilles niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen beperkingen bekend voor geneesmiddelen die tijd bevatten.

Tymaki gompastilles bevat vloeibare maltitol en glucose.

Als uw arts u heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voor u dit geneesmiddel gebruikt.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is

Tenzij uw arts iets anders voorschrijft:

Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar:

3- tot 4-maal per dag 3-4 gompastilles (stemt overeen met 3.024 - 5.376 mg tijmkruid per dag).

Gebruik bij kinderen

Bij kinderen jonger dan 12 jaar mag Tymaki gompastilles niet worden gebruikt.

Wijze van toediening

De gompastilles moeten worden opgezogen (niet gekauwd).

Duur van gebruik:

Indien de symptomen langer dan 1 week aanhouden moet u uw arts raadplegen.

Spreek met uw arts of apotheker als u de indruk heeft dat de werking van Tymaki gompastilles te sterk of te zwak is.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u teveel van Tymaki gompastilles heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Tot nog toe zijn er geen gevallen van vergiftiging met Tymaki gompastilles bekend. Mogelijk treden de hieronder vermelde bijwerkingen in sterkere mate op.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

BIJSLUITER

Neem geen dubbele dosis Tymaki gompastilles in om een vergeten dosis in te halen, maar zet de inname voort zoals wordt beschreven in de rubriek “De aanbevolen dosering is”.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Tymaki gompastilles bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer zelden (kan tot 1 op de 10.000 mensen treffen) treden overgevoeligheidsreacties op zoals ademnood, huiduitslag, netelroos en zwelling van het gezicht, de mond en/of de keelholte.

Zeer zelden kunnen er maagklachten, krampen, misselijkheid en braken optreden.

Bij het eerste teken van overgevoeligheidsreactie mag u Tymaki gompastilles niet opnieuw innemen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via :

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie

EUROSTATION II

Victor Hortaplein, 40/ 40

B-1060 Brussel

Website: www.fagg.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na EXP . Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

BIJSLUITER

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is:

1 gompastille bevat 42 mg droog extract van *Thymus vulgaris/ Thymus zygis* L., herba (tijmkruid) (6-10/1). Dit stemt overeen met 336 mg tijmkruid. Extractiemiddel: ethanol 70% (v/v);

De andere stoffen in dit middel zijn:

Arabische gom, vloeibare maltitol (E965) , natriumsacharinaat (E954), paraffine, witte bijenwas (E901), glucose, watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551), pepermuntolie, eucalyptusolie, gezuiverd water.

Hoe ziet Tymaki gompastilles eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Bruinzwarte, ronde, aan één kant gewelfde, harde pastilles.

Verpakkingen met 30 gompastilles.

Registratiehouder en fabrikant

Registratiehouder

Amophar
Molenberglei 36,
2627 Schelle

Fabrikant

Dr. Poehlmann & Co. GmbH
Loerfeldstraße 20 ·
58313 Herdecke
Duitsland

Registratienummer

BE-TU478453

Afleveringswijze: vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2016