

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Flexiflor gel

Ledum MT, Rhus toxicodendron MT, Symphytum ex herba MT

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Flexiflor gel en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
2. Wanneer mag u Flexiflor gel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Flexiflor gel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Flexiflor gel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Flexiflor gel en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

Flexiflor gel is een homeopathisch geneesmiddel met bestanddelen die traditioneel gebruikt worden bij musculoskeletale klachten die het gevolg zijn van overbelasting, zoals spier- en gewrichtspijnen, pijnlijke spierspanning en verstuikingen.

2. Wanneer mag u Flexiflor gel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Flexiflor gel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor *Rhus toxicodendron* (gifsumak) of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- Bij kinderen jonger dan 1 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Flexiflor gel?

- Flexiflor gel bevat *Rhus toxicodendron*. Door zijn sensibiliserende eigenschappen zouden intolerantiereacties zoals allergische huidreacties kunnen optreden.
- Raadpleeg uw arts:
 - als de klachten niet verbeteren of verergeren.
 - als er bijkomende klachten ontstaan.
- Vermijd contact van de gel met ogen, slijmvlies en open wonden.
- Gebruik Flexiflor gel niet op een beschadigde of geïrriteerde huid.
- Was uw handen grondig na het aanbrengen van de gel.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Kinderen

Flexiflor gel mag gebruikt worden bij kinderen vanaf 1 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Gebruikt u naast Flexiflor gel nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Flexiflor gel heeft geen invloed op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.

Flexiflor gel bevat alcohol (ethanol)

Flexiflor gel bevat 15% v/v alcohol (ethanol). Dit geneesmiddel kan een brandend gevoel geven op uw huid als uw huid beschadigd is.

3. Hoe gebruikt u Flexiflor gel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De geadviseerde dosering is:

Volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar: de gel 3 maal per dag aanbrengen in een dunne laag op de pijnlijke zone en licht inmasseren. Gebruik niet meer dan 10 cm gel per keer.

Heeft u te veel van Flexiflor gel gebruikt?

Er werden geen gevallen van overdosering gerapporteerd. Wanneer te veel Flexiflor gel werd gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw apotheker, arts of het Antigifcentrum (070 245 245).

Bent u vergeten Flexiflor gel te gebruiken?

Wanneer u de gel bent vergeten te gebruiken, gebruik dan geen dubbele dosis.

Als u stopt met het gebruik van Flexiflor gel

Er zijn geen schadelijke effecten te verwachten als u stopt met het gebruik van Flexiflor gel.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

In zeer zeldzame gevallen kunnen lokale intolerantiereacties zoals allergische huidreacties voorkomen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

www.fagg.be

Afdeling Vigilantie:

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Flexiflor gel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Flexiflor gel is 5 jaar houdbaar. De houdbaarheid na opening is 12 maanden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos en de tube na de vermelding "EXP:".

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert, worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Flexiflor gel?

- De werkzame stoffen in Flexiflor gel zijn: Ledum (moerasrozemarijn) MT 2,5 g, Rhus toxicodendron (gifsumak) MT 2,0 g en Symphytum (smeerwortel) ex herba MT 10,0 g per 100 g gel.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in Flexiflor gel zijn: gezuiverd water, natriumhydroxide 32%, carbomeer, ethanol 94%.

Hoe ziet Flexiflor gel eruit en wat zit er in een verpakking?

Flexiflor gel is een gele tot bruine, transparante gel in een aluminium tube van 50 g of 100 g met plastieken schroefdop.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Schwabe Pharma Belgium
Prins Boudewijnlaan 7D bus 0301
B-2550 Kontich
Tel: +32 (0) 34508160
e-mail: info@schwabe.be

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

HO-BE663462

Afleveringswijze

Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2024.