

TOULARYNX THYM 5 g/100 g, siroop

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat.

Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.

Desalniettemin dient u TOULARYNX THYM 5 g/100 g, siroop zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.



- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig hebt.
- Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na 4 à 5 dagen niet verbeteren

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is TOULARYNX THYM 5 g/100 g, siroop en waarvoor wordt het ingenomen?
2. Wat moet u weten voordat u TOULARYNX THYM 5 g/100 g, siroop inneemt?
3. Hoe wordt TOULARYNX THYM 5 g/100 g, siroop ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u TOULARYNX THYM 5 g/100 g, siroop?
6. Aanvullende informatie.

TOULARYNX THYM 5 g/100 g, siroop

De werkzame stof is Thymus vulgaris L. vloeibaar hydroalcoholisch (31.5 % V/V) extract [1:1,1-1:1,3] 5 g/100 g

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn Acidum citricum anhydr. - Natrii benzoas - Kalii sorbas - Natrii citras dihydr. - Maltitolum liquidum - Aqua purificata q.s. 100 g

Registratiehouder :

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België

Fabrikant

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België

Registratienummer: 246 S 846 F8

1. WAT IS TOULARYNX THYM 5 G/100 G, SIROOP EN WAARVOOR WORDT HET INGENOMEN?

Farmaceutische vorm en verpakkingsgrootte: fles van 125 of 180 ml.

Groep: Geneesmiddel op basis van planten, gebruikt voor aandoeningen aan de luchtwegen.

Gebruikt bij verkoudheden, keelpijn en om hoest te verzachten nadat elke ernstige pathologie werd uitgesloten.

2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U TOULARYNX THYM 5 G/100 G, SIROOP INNEEMT?

Gebruik TOULARYNX THYM niet...

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor thijm vloeibaar extract of voor één van de andere bestanddelen van TOULARYNX THYM.

Pas goed op met TOULARYNX THYM ...

- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek te lezen: "Gebruik van TOULARYNX THYM in combinatie met andere geneesmiddelen".
- Als u lijdt aan alcoholisme door de aanwezigheid van ethanol in het vloeibaar thijm extract

Raadpleeg uw arts of apotheker indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van TOULARYNX THYM in combinatie met voedsel en drank

Er zijn geen wisselwerkingen gekend.

Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over TOULARYNX THYM om mogelijke negatieve effecten tijdens de zwangerschap uit te sluiten.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over TOULARYNX THYM om mogelijke negatieve effecten tijdens de borstvoeding uit te sluiten.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van TOULARYNX THYM heeft geen invloed op het besturen van voertuigen of het gebruik van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van TOULARYNX THYM

Dit geneesmiddel bevat de bewaarmiddelen Na-benzoaat en K-sorbaat.

Thijm vloeibaar extract bevat ethanol. Dit kan schadelijk zijn voor mensen die lijden aan alcoholisme.

Gebruik van TOULARYNX THYM in combinatie met andere geneesmiddelen

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

3. HOE WORDT TOULARYNX THYM 5 G/100 G, SIROOP INGENOMEN?

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts of apotheker u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.

Toedieningsweg: oraal gebruik.

Deze siroop is suikervrij en kan aldus zonder problemen gebruikt worden door diabetici.

Kinderen van 6 maanden tot 2 jaar: Neem 3 x per dag 1 koffielepel (5 ml).

Kinderen van 2 tot 6 jaar: Neem 3 tot 6 x per dag 1 koffielepel (5 ml).

Kinderen van 6 tot 12 jaar: Neem 2 tot 4 x per dag 1 eetlepel (15 ml).

Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen: Neem 3 tot 6 x per dag 1 eetlepel (15 ml).

Wat moet u doen wanneer u TOULARYNX THYM vergeet te gebruiken

Niet van toepassing.

Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met TOULARYNX THYM wordt gestopt

Niet van toepassing.

Wat moet u doen als u meer van TOULARYNX THYM heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u te veel van TOULARYNX THYM heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Overmatig gebruik zou irritatie van de maag kunnen veroorzaken. In dat geval moet de dosis verminderd worden of moet met de behandeling gestopt worden. De behandeling verloopt symptomatisch.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan TOULARYNX THYM bijwerkingen hebben.

Ingeval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U TOULARYNX THYM 5 G/100 G, SIROOP?

TOULARYNX THYM buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, buiten invloed van het licht. Niet bewaren boven de 25°C.

Gebruik TOULARYNX THYM niet meer na de datum achter “niet te gebruiken na” of “exp” op het etiket/buitenverpakking/fles. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De vervaldag is de laatste dag van de vermelde maand.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.

Desgewenst kan u ook contact opnemen met de contactpersoon van de registratiehouder:

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A.

Rijksweg 9

2880 Bornem

Tel.: 03/889.17.21

Vrij verkrijgbaar in de apotheek.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 04/09/2006.