

Aporil

Thuyatinctuur 45 mg/1g, Stinkende gouwe tinctuur 45 mg/1g, Salicylzuur 135 mg/1g, Melkzuur 20 mg/1g, Azijnzuur 80 mg/1g

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.



- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na enkele weken niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Aporil en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Aporil niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Aporil?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Aporil?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

1. WAT IS APORIL EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Aporil wordt gebruikt om wratten en eksterogen te behandelen.

2. WANNEER MAG U APORIL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Aporil niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

- Vermijd contact met gezonde huid, slijmvliezen, ogen of (ontstoken) wonden. De gezonde huid rond het letsel kan beschermd worden met een laagje vaseline.
- Dit product is niet geschikt voor behandeling van wratten in het gelaat en op de geslachtsdelen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Aporil?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Aporil gebruikt.

- Vermijd contact met gezonde huid, slijmvliezen, ogen of (ontstoken) wonden. De gezonde huid rond het letsel kan beschermd worden met een laagje vaseline.
- Het product mag niet in het aangezicht of op de geslachtsdelen gebruikt worden.
- Hou het product verwijderd van vuurbronnen tijdens het gebruik, want het is zeer ontvlambaar.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Aporil nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

- De aanwezigheid van water verhoogt de etsende werking van het product.
- Gebruik van salicylzuur in combinatie met Zink oxide vormt farmacologisch inactief Zink salicylaat.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Dit geneesmiddel is bestemd voor een plaatselijke uitwendige behandeling. Het kan worden gebruikt tijdens zwangerschap. Het wordt echter aangeraden de behandelende arts hiervan op de hoogte te brengen.

Borstvoeding

Het product kan gebruikt worden tijdens de borstvoeding, op voorwaarde dat het niet wordt aangebracht in de directe omgeving van de borsten. Het wordt aangeraden de behandelende arts hiervan op de hoogte te brengen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

3. HOE GEBRUIKT U APORIL?

Gebruik Aporil altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Schudden voor gebruik. Breng 2 tot 3 keer per dag met behulp van het staafje een druppel Aporil aan op de wrat. Laat het drogen zodat er een film gevormd wordt. Het vorige vliesje steeds verwijderen met wat ether of alcohol. Zorg ervoor dat het product niet in aanraking komt met de gezonde huid. De gezonde huid rond de wrat kan beschermd worden door uitstrijken van een laagje vaseline.

Uw arts of apotheker zal u vertellen hoe lang u Aporil moet gebruiken. De behandeling duurt meerdere weken tot enkel maanden (vb. wratten op voetzool).

Heeft u te veel van Aporil gebruikt?

Bij lokaal, uitwendig gebruik zijn de risico's op overdosering onbestaand. Er is wel risico op ontstaan van brandwonden indien teveel product wordt aangebracht.

Overdosering kan optreden wanneer, door onvoorzichtigheid of onoplettendheid, een grote hoeveelheid van de oplossing wordt ingeslikt.

Wanneer u te veel van Aporil heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Volgende symptomen kunnen optreden na accidentele opname: opname van 7,5 ml kan dodelijk zijn bij opname door kinderen, corrosie van de slokdarm en maagwand, salicylzuur vergiftigingsverschijnselen.

Behandeling: zo snel mogelijk hospitaliseren, het product proberen te verwijderen uit de mond door de mond veelvuldig te spoelen en uit de maag door een maagspoeling te laten doen. Om te vermijden dat het product zich vasthecht aan de wand, kunnen kaolien, aardappelpuree of broodkruimels opgenomen worden. Zorg voor een goede ventilatie. Zet de behandeling symptomatisch verder, afhankelijk van de algemene toestand van de patiënt.

Bent u vergeten Aporil te gebruiken?

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Als u stopt met het gebruik van Aporil

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Zoals elk geneesmiddel kan Aporil bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

- Bij contact met de slijmvliezen, ogen en intacte huid bestaat een kans op irritatie, allergische reacties en beschadiging van de huid die kan evolueren in lokale ontsteking.
- Gebruik van teveel vloeistof kan aanleiding geven tot brandwondjes, vooral bij toepassing op dunne huid (vb. handrug).
- Indien deze bijwerkingen voorkomen, moet men onmiddellijk stoppen met de behandeling.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

België

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie

EUROSTATION II

Victor Hortaplein, 40/ 40

B-1060 Brussel

Website: www.fagg.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Luxembourg/Luxemburg

Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments

Villa Louvigny – Allée Marconi

L-2120 Luxembourg

Site internet: <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U APORIL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, verwijderd van vuurbronnen. Aporil is licht ontvlambaar. Na gebruik goed afsluiten om verdamping van de vloeistof te vermijden. Gebruik Aporil niet meer na de

uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket/de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.

Welke stoffen zitten er in Aporil?

- De werkzame stof in Aporil is Thuyatinctuur, Stinkende gouwe tinctuur, Salicylzuur, Melkzuur, Azijnzuur.
- De andere stof in Aporil is Collodium elasticum.

Hoe ziet Aporil eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Aporil is beschikbaar in een bruin glazen flesje met 10 ml vloeistof afgesloten met een staafje dat vastzit in het stopje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 – 2880 Bornem – België

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:

276 S43 F11

Afleveringswijze: Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 01/2015.