

Vicks Expectorant Honing, 13,33mg/ml, siroop
guaifenesine

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Vicks Expectorant Honing en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Vicks Expectorant Honing en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

Vicks Expectorant Honing wordt gebruikt bij luchtwegaandoeningen om het ophoesten van slijmen te vergemakkelijken. Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet innemen?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt.
- Als u aan porfyrie (verstoorde aanmaak van de rode bloedkleurstof) lijdt.
- Bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

- Als u suikerziekte (diabetes) heeft, hou dan rekening met het suikergehalte (5,55g suiker per 15ml siroop).
- Gebruik dit geneesmiddel niet langer dan 4 à 5 dagen zonder een arts te raadplegen. Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt in geval van langdurige hoest, zoals die voorkomt bij roken, astma, chronische bronchitis (langdurige luchtwegontsteking) of longemfyseem (longaandoening als gevolg van verlies van soepelheid van het longweefsel, wat gepaard gaat met kortademigheid).
- Als u een leveraandoening heeft of lijdt aan vallende ziekte (epilepsie) of alcoholisme. Dit geneesmiddel bevat namelijk 640mg alcohol (ethanol) per 15ml siroop. Dit komt overeen met 15ml bier of 6,3ml wijn. Om die reden moet u ook voorzichtig zijn bij kinderen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Kinderen:

- Dit geneesmiddel bevat 640mg alcohol (ethanol) per 15ml siroop. Dit komt overeen met 15ml bier of 6,3ml wijn. Om die reden moet u ook voorzichtig zijn bij kinderen.
- Kinderen jonger dan 6jaar mogen dit geneesmiddel niet innemen.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Gebruikt u naast Vicks Expectorant Honing nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Als u een leveraandoening heeft of lijdt aan vallende ziekte (epilepsie) of alcoholisme. Dit geneesmiddel bevat namelijk 640mg alcohol (ethanol) per 15ml siroop. Dit komt overeen met 15ml bier of 6,3ml wijn.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid:

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruik Vicks Expectorant Honing **niet** gedurende de **eerste drie maanden** van een **zwangerschap**.

Gebruik Vicks Expectorant Honing **niet** wanneer u **borstvoeding** geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Vicks Expectorant Honing kan slaperigheid en duizeligheid bij u veroorzaken. Als u hiervan last heeft, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines.

Vicks Expectorant Honing bevat:

- **Ethanol (alcohol):** 5 vol%; d.w.z. 640mg alcohol per dosis (15ml), hetgeen overeenkomt met 15ml bier of 6,3ml wijn. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, evenals bij kinderen, alcoholisten en patiënten met een leveraandoening of vallende ziekte (epilepsie).
- **Natrium:** 1,3mmol (of 30mg) per dosis van 15ml. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdiet.
- **Sucrose:** 5,55g suiker per 15ml siroop. Indien u arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel neemt.

3. Hoe neemt u dit middel in?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Kinderen < 6 jaar	Niet toedienen
Kinderen 6-12 jaar	Neem niet meer dan 10ml 3 tot 4 maal per dag. Max: 15ml per inname en 60ml per 24 uur.
Volwassenen en kinderen > 12 jaar	Neem niet meer dan 15ml 3 tot 4 maal per dag. Max: 30ml per inname en 120ml per 24 uur.

Gebruik de bijgevoegde doseerbeker om de juiste hoeveelheden af te meten.

Toediening:

Goed schudden voor gebruik.

Vicks Expectorant Honing wordt via de mond ingenomen. Oraal gebruik.

Houd de behandeling zo kort mogelijk (niet meer dan 5 dagen zonder een arts te raadplegen).

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u te veel van Vicks Expectorant Honing heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Symptomen bij volwassenen: misselijkheid, braken. Bij herhaalde overdosering kunnen nierstenen ontstaan.

Symptomen bij kinderen: misselijkheid, braken, een vertraagde hartslag, duizeligheid, een verlaagde bloeddruk. Na overdosering met zeer hoge dosissen kan een verlamming van de ledematen ontstaan.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel:

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Maagdarmslaandoeningen: braken, verstopping (constipatie) en misselijkheid.

Zenuwstelselaandoeningen: mogelijk lichte slaperigheid en duizeligheid, hoofdpijn.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker . Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

- U kunt in België bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be,
- in Luxemburg via Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg - Website: <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket na "Exp". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De **werkzame stof** in dit middel is guaifenesine 13,33mg/ml.

De **andere stoffen** in dit middel zijn sucrose, propyleenglycol, ethanol 96% v/v, natriumcitraat, natriumcarboxymethylcellulose, watervrij citroenzuur, polyoxyl 40 stearaat, verveine aroma, honing-gember aroma, natriumbenzoaat, polyethyleenoxide, natriumsaccharine, levomenthol, gezuiverd water.

Lees ook in rubriek 2. "Vicks Expectorant Honing bevat".

Hoe ziet Vicks Expectorant Honing er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Vicks Expectorant Honing is een gelachtige gele siroop die wordt verkocht in een geelbruine glazen fles van 100, 120, 150, 180, 220 of 240ml met kinderveilige sluiting en doseerbeker. Niet alle verpakkingen zijn op de markt.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Procter & Gamble Distribution Company Europe BVBA, Temselaan 100, B-1853 Strombeek-Bever, Info: 0800/15174 (9 - 17 h)

Fabrikant:

Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Procter & Gamble Straße 1, D-64521 Groß-Gerau, Duitsland

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE172961

Afleveringswijze: Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 05/2016